
4.其它
①红细胞↑、淋巴细胞和单核细胞↑ 与免疫有关→慢性炎症　加速物质代谢造成局部缺氧→HIF↑→EPO↑→RBC↑
②骨基质蛋白分解致骨质脱钙（**骨质疏松**）→血钙↑→尿钙↑
③核蛋白分解↑→核酸释放→嘌呤↑→尿酸↑ 核蛋白=核酸+蛋白质
④血钾↓（钠泵↑→钾转入细胞）、血镁↓ 镁钾是一家

5.周期性瘫痪/麻痹 钠泵↑→血钾↓→细胞内外钾浓度差↑→钾外流↑→静息电位↑→兴奋性↓
①**血钾降低**（主要是钾**分布异常**）激活钠钾泵→K^+入胞
②亚洲**男**性 ttsx 青壮年易发生
③**双下肢对称肌无力** VS 过敏性紫癜:双下肢对称出血点
④劳累运动、碳水化合物、胰岛素诱发→促进K^+入胞
⑤用**乙酰唑胺预防** 血糖↑




《药理学》：为什么乙酰唑胺可导致低钾血症（乙酰唑胺抑制碳酸酐酶→Na-H 交换↓→K^+分泌↑）、却能预防因为低钾血症引起的甲亢周期性瘫痪？（乙酰唑胺可能激活 Ca^{2+}敏感性 K^+通道）
氢氯噻嗪是利尿剂,却可用于治疗肾性尿崩症

可能可能最可能：**Graves 病患者多吃多拉多汗、激动的心、颤抖的手、突突的眼、瘦瘦的身体、有的时候不能走，甲状腺弥漫对称无痛肿大** 周期性瘫痪

（二）多数患者有甲状腺肿大

①呈**弥漫对称**性
②质地中等（病程较长者可坚韧）纤维↑
③无压痛
④可伴震颤、血管杂音
⑤甲状腺肿大程度与病情轻重**不**完全相关
部分患者,尤其是老年人可不肿大



判断病情严重用基础代谢率

（三）眼征

1.**单纯性突眼**（主要）：交感神经兴奋性增高
①眼裂增宽
②轻度突眼：突眼度超过参考值＜3mm（参考值女 16mm、男 18.6mm）
③征象：




Joffroy 征	皱额无能：眼球向上看时前额皮肤不出现皱纹（没抬头纹了、J-上）
Graefe 征	上睑挛缩：眼球向下看时出现白色巩膜（眼球下转时上睑不能相应下垂）（往下翻白眼、G-下）
Stellwag 征	瞬目减少：眨眼减少（shun）
Mobius 征	辐辏无能：双眼看近物时双眼会聚异常（摸鼻屎-狐臭）









看近物的调节:晶状体的调节(最重要)、瞳孔调节反射(近反射)、视轴会聚(辐辏反射)