TBG:血浆中运输甲状腺激素的蛋白质
不是甲状腺球蛋白TG(甲状腺激素的原料)

（六）妊娠期甲亢

（1）妊娠→甲状腺结合球蛋白 TBG↑→TT_3、TT_4↑（总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4），所以妊娠期诊断甲亢不用 TT_3、TT_4 用游离FT3游离FT4

《诊断学》：

TBG↑：妊娠、雌激素（某些避孕药）、急性病毒性肝炎等
TBG↓：雄激素、糖皮质激素、低蛋白血症（如肾病综合征）等
分解蛋白质

（2）妊娠期手术时机：妊娠中期（4-6 月）有手术适应症、且无手术禁忌症时（早晚要出事）

真题解析 • Graves 病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N108-110 A 女性，35 岁，乏力，心悸一年余，近 2 个月症状加重，伴厌食、消瘦、手颤。查体：甲状腺弥漫性肿大，心率 126 次/分，心律整。实验室检查示 FT_3、FT_4 显著增高，TSH 降低。

108.该患者最可能的诊断是

A.Graves 病
B.自身免疫性甲状腺炎 桥本(甲减)
C.多结节性病毒性甲状腺肿 结甲
D.亚急性甲状腺炎 外科考

109.为进一步确诊，以下检查项目中意义重大的是

A.促甲状腺激素受体抗体 TRAb,尤其是TSAb,Graves病的一线诊断指标
B.^{131}I 摄取率
C.甲状腺 B 超
D.甲状腺核素显像

110.对该患者治疗，应首选的方法是

A.咪唑类药物
B.手术治疗
C. ^{131}I 治疗
D.碘制剂

感性认识:浸润性突眼是一种自身免疫,是炎症反应,选红肿热痛

2. 2016N174 X Graves 眼病活动期的指标有 1238

A.眼球活动性疼痛
B.突眼度 增加≥2mm
C.复视
D.结膜充血

指标	视力下降≥1 行
	突眼度增加≥2mm，眼睑充血、结膜充血，自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛 2个“血”2个“痛”
	眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀 球结膜肿胀无需看近物就会有复视 3个“肿”
	任一方向眼球运动减少≥8 度
治疗	可给糖皮质激素（糖皮质激素可致低钾）保钠排水排钾

3. 2017N88-90 A 女性，25 岁，低热，乏力，心悸 2 周余。检查甲状腺弥漫肿大I度，无触痛，心率 110 次/分。血液检查 FT_3、FT_4 明显升高，TSH 明显降低。甲亢

88.该患者最可能的诊断是

A.Graves 病
B.亚急性甲状腺炎

答案:1-3 AAA ACD ABA