C.结节性甲状腺肿
D.自身免疫性甲状腺炎
89.该患者最恰当的治疗是
A.^{131}I 治疗
B.甲巯咪唑
C.糖皮质激素治疗
D.口服非甾体类抗炎药

药物无效→手术/^{131}I

90.患者经治疗后，甲状腺激素水平仍较高，症状不缓解，下一步最恰当的处理是
A.^{131}I 治疗
B.改服碘剂治疗 用于甲危/原发性甲亢的术前准备
C.糖皮质激素加量
D.加服 β 受体拮抗剂 辅助措施

4. 2018N55 A 以下关于甲状腺毒症周期性瘫痪的临床表现中，正确的是
A.以亚洲青年女性多见 男性多见
B.与甲亢疾病严重程度相平行 BMR
C.高碳水化合物饮食可诱发 胰岛素↑→K^+入胞
D.为不对称性肢体软瘫

一般:甲状腺疾病女性多见,胆囊疾病也是为女性多见(雌激素抑制胆囊收缩)
特殊:周期性瘫痪男性多见,非结石性胆囊炎为男性多见

5. 2020N76-78 A 女性，60 岁。1 个月来无诱因感心悸，呈发作性，持续 1-2 小时可自行缓解，半小时前再次发作来院。近半年来自觉消瘦、乏力、出汗，食欲好，睡眠差，血压升高。查体：T 37.2℃，P 90 次/分，BP 140/70mmHg，皮肤出汗，颈部未闻及血管杂音，双肺正常，心界不大，心律不整，手颤(±)。心电图显示：心室率 136 次/分，P 波消失，可见形态不等的 f 波，QRS 波时限 0.08s，间距不等。
76.该患者最可能的诊断是

房颤

若题目为:年龄更大,甲状腺无肿大→淡漠型甲亢(常伴有房颤、易发生甲危,明显消瘦)

A.阵发性室上性心动过速
B.频发性房性期前收缩
C.阵发性心房颤动 无窦性心律(无P波)
D.阵发性心房扑动
77.该患者最可能的原发病因是
A.高血压
B.糖尿病
C.冠心病
D.甲状腺功能亢进症
78.该患者正确的治疗措施是
A.选用洋地黄类药物减慢心室率
B.行射频消融术转复心律
C.治疗原发病
D.临床观察

6. 2021N88-90 A 女性，30 岁。多食、易饥、多汗伴大便次数增多 3 个月，体重下降 7kg。查体：皮肤湿润，弥漫性甲状腺II度肿大。心率 120 次/分，律不齐，早搏 3-4 次/分。实验室检查：TgAb(-)，TPOAb(-)，TRAb(+)，肝功能和血常规均正常。

答案:4-6 C CDC ABB