复习肝硬化腹水的一般治疗：利尿剂首选醛固酮受体拮抗剂螺内酯，与呋塞米按 100:40 联合使用
（肝硬化腹水机制之一是肝对醛固酮和抗利尿激素灭活减弱→继发醛固酮和抗利尿激素增多）

真题解析·原发性醛固酮增多症

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N74 A 原发性醛固酮增多症首选的治疗方法
A.手术治疗
B.螺内酯
C.氨苯蝶啶
D.血管紧张素转换酶抑制剂

2. 2014N73 A 原发性醛固酮增多症最常见、最早出现的临床表现是
A.心律失常
B.高血压
C.低血钾症
D.周期性麻痹

3. 2016N74 A 男性，31 岁，3 个月来感全身乏力、手颤，体重下降 7kg。4 小时前起床时感双下肢不能活动。既往体健。查体：心率 120 次/分，血 K^+ 2.7mmol/L，Na^+ 140.6mmol/L，Cl^- 105.1mmol/L，HCO_3^- 25.3mmol/L，患者最可能的诊断是
A.家族性周期性麻痹
B.甲状腺毒症性周期性瘫痪
C.肾小管酸中毒
D.原发性醛固酮增多症

周期性瘫痪
干燥综合征累及肾小管导致肾小管泌酸障碍(酸中毒)
乙酰唑胺影响碳酸氢根重吸收→Na^+-H^+交换↓→肾小管酸中毒
→Na^+-H^+交换↓→K^+分泌↑→低钾→肌无力(瘫痪)
题目没有高血压

4. 2024N55 A 对确诊原发性醛固酮增多症最有价值的实验室检查结果是
A.尿 pH 偏碱性，比重在 1.010-1.018
B.血浆醛固酮/血浆肾素活性比值＞~~50~~ 30
C.尿钾＞25mmol/24 小时
D.血 pH 和 CO_2 结合力高于正常

醛固酮↑→肾素↓AngⅡ↓　醛固酮的亲爹是RAAS
碱中毒

思维导图·原发性醛固酮增多症

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:1-4 B B B B