4.不适合 T2DM 的胖胖：磺酰脲类、格列奈类（适合胖胖不奇怪、记少不记多）

（二）选药技巧

1.选项中有胰岛素：过一遍胰岛素的适应症看是否适合，如 T1DM（40 岁以下瘦瘦多见）、胰岛素明显不足的 T2DM、严重糖尿病并发症、手术、妊娠、分娩

①如果要降低餐后血糖：短效胰岛素或速效胰岛素类似物（一餐后高血糖）、中效胰岛素（两餐后高血糖）

②如果要提供基础胰岛素：中效胰岛素、长效胰岛素 ttsx

③如果要抢救 DKA、HHS：静脉注射短效/普通胰岛素/RI

2.T2DM

25以上-超重、28以上-肥胖

（1）**T2DM 胖胖（BMI≥25 尔我胖瘦）症状不重首选饮食运动疗法、否则首选双胍类**

本身不导致体重↓
但改善组织对胰岛素的敏感性

（2）**伴 ASCVD：双胍类、SGLT-2i 格列净（体重↓）、GLP-1RA 司美格鲁肽/替尔泊肽（体重↓）**3 个 G

主要矛盾点:空腹血糖还可以,主要是餐后血糖高

（3）**主要降 T2DM 餐后高血糖**（空腹血糖和 7 比、餐后血糖和 11.1 比）

①**α-糖苷酶抑制剂（如阿卡波糖）：胖胖**（糖-固体）

②**格列奈类（如瑞格列奈）：瘦瘦**（奶-液体）

血糖： 7 11 6.5
β细胞：↓ 高峰延迟
MODY 线 LADA

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

真题解析·糖尿病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

年龄较大优先考虑T2DM

1.2013N73 A 男性，82 岁。体型较消瘦，3 个月前口服葡萄糖耐量试验诊断为糖尿病，平时空腹血糖 6.5-7.2mmol/L，餐后 2 小时血糖 12-14mmol/L，有冠心病、心衰病史 10 年，结肠癌术后 5 年。为控制血糖，该患者宜首选

和7比　和11.1比　不是糖尿病导致　空腹血糖还可以,主要降餐后高血糖

A.胰岛素
B.阿卡波糖 胖胖
C.二甲双胍
D.那格列奈 瘦瘦

2.2014N74 A 女性，35 岁。1 个月前与人争吵后开始出现口渴、多饮，体重下降 3 公斤，既往无糖尿病史，体重指数 21，空腹血糖 15.9mmol/L，尿酮体(++)，该患者最适合的治疗

40岁以下+瘦瘦+酮症

A.使用胰岛素
B.使用磺脲类药物
C.使用双胍类药物
D.使用磺脲类加双胍类药物

3.2014N174 X 以下关于糖尿病的检查中，说法正确的有

A.全血血糖高于血浆血糖
B.GHbA1c 主要反映近 2-3 个月血糖总水平
C.胰岛素和 C 肽测定有助于糖尿病诊断 用来鉴别1型还是1.1型

答案：1-3 D A BD