D.抗 CCP 抗体对 RA 诊断的敏感性高，特异性低都高

5.2022N91-92 A 女，45 岁。两个月来无诱因出现双上肢关节疼痛伴晨僵，每于早晨起床后两手指关节僵硬感，持续约 1 个多小时后逐渐缓解，未诊治，3 天来加重来诊，病后进食好，大小便正常。既往体健。查体：双侧前臂伸面对称部位各触及两个皮下结节，直径约 5mm，活动，质硬，无压痛，心肺腹检查未见异常，双上肢近端指间关节、掌指关节和腕关节肿胀，有压痛，下肢不肿。

91.该患者最可能的诊断是

A.类风湿关节炎

B.风湿热

C.强直性脊柱炎

D.系统性红斑狼疮

92.最有诊断价值的实验室检查是

A.血清抗 Sm 抗体

B.红细胞沉降率

C.HLA-$B_{27}$

D.血清抗 CCP 抗体

以题带动
知识点复习

6.2025N91-92 A 男性，57 岁。反复多关节肿痛伴晨僵 1 年余，主要表现为双手指关节和双腕关节肿痛。查体见双手近端指间关节梭形肿胀，双腕关节肿胀。

91.最可能的诊断是

A.风湿性关节炎

B.系统性红斑狼疮

C.类风湿关节炎

D.银屑病关节炎

92.最有助于确定诊断的辅助检查是

A.血清抗核抗体

B.血清抗链“O”

C.血清 HLA-$B_{27}$

D.双手、腕关节 X 线片

## 外科学

7.2021N165 X 以下叙述中，符合类风湿关节炎诊断标准的有

A.3 个关节肿胀（≥6 周） 晨僵+三个描述关节的(多发、对称、好发部位)+关节外表现+影像学表现+血清学检查

B.关节畸形（≥6 周）

C.晨僵至少 1 小时（≥6 周）

D.对称性关节肿胀（≥6 周）

**思维导图 • 类风湿关节炎（内科+外科）**

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案：5-7 AD CD ACD