二、中毒的解救

（多用排除法）

1.**洗胃禁忌**（石破昏惊）

强腐蚀性毒物	插管致穿孔
食管静脉曲张	插管致破裂出血
昏迷	插管致吸入性肺炎
惊厥	插管致惊厥

注意：
①腐蚀性酸：强酸（盐酸、硝酸、硫酸）、石炭酸/苯酚、醋酸（十分吃醋）
②腐蚀性碱：氢氧化钠/钾、氧化汞
③**禁止强酸、强碱中和**（放出大量热量）；可以弱酸（果汁）、弱碱（氢氧化铝凝胶）中和

2.导泻**禁用硫酸镁**的情况：**肾衰**、**呼衰、昏迷、磷化锌和有机磷中毒晚期**（深呼吸、心凌美晕了）

镁和钙相互拮抗，会抑制呼吸，抑制中枢

镁和钾通过肾脏排泄

肝性脑病并发昏迷尽量不使用硫酸镁

3.血液净化

血液灌流（最常用）	适合巴比妥类、百草枯等 好怕医生抽血	灌溉碧草
血浆置换	适合 **Goodpasture**、急进性肾炎**I**和**III**型、**生物毒（蛇/蕈）**、砷化氢等	换肾/生/砷
血液透析	适合重铬酸盐、氯酸盐等 ttsx	投投革履

吸附作用

血液透析和利尿针对的是水溶性的

注意：血液灌流尤其适合脂溶性（吸附）；而**血液透析和利尿禁用于有脂溶性**的如**有机磷、导眠能/格鲁米特、短效巴比妥/司可巴比妥**（领导/公司格外短浅不要透析）透析会加重动脉粥样硬化

4.解毒药

中毒	解毒药	记忆
铅	**依地酸钙钠 EDTA**	乞丐要一地钱
砷、汞、铜、锑等**重金属**	二**巯**丙磺钠/丙醇/丁二钠 巯基(-SH)	申公豹痛哭流涕重金求子
铁、镍、铊	去铁胺	去捏他
氰化物	**亚硝酸异戊酯、硫代硫酸钠**	一代青年
亚硝酸、硝基苯、苯胺	**小**剂量**亚甲蓝/美蓝** 纽-蓝	小小笨蛋
甲醇（假酒喝瞎了）、乙二醇	**甲吡唑**、乙醇	甲乙 （甲醇、乙胺丁醇可致视神经炎）
吗啡等阿片类药	**纳洛酮**	哪里痛
地西泮等**苯二氮䓬类药** 卓玛	**氟马西尼** 对三/四期肝性脑病患者有促醒作用	西
镇静催眠药	**高锰酸钾**	高枕无忧
磺酰脲类药胰岛素过量释放→低血糖	**奥曲肽** 生长抑素的类似物	生长抑素抑制胰岛素分泌（月）
杀鼠药	**维生素 K、烟酰胺**	kill 鼹鼠
奎尼丁、三环类抗抑郁药阿米替林、普鲁卡因、**β-R 拮抗剂、CCB** 中毒后会出现低血压	**胰高血糖素**→诱发儿茶酚胺释放 （嗜铬细胞瘤间歇期→胰高血糖素激发试验）	盯着阿卡波儿糖 嗜铬细胞瘤在发作期查儿茶酚胺即可

肝硬化食管胃底静脉曲张破裂出血首选的血管收缩剂-生长抑素/奥曲肽