
（2）解毒药

①胆碱酯酶复活药：如**氯解磷定**，可恢复胆碱酯酶活性、缓解外周 **N** 样症状（绿帽子喝农药）
不良反应有眩晕、复视、视力模糊、血压升高，用量过大引起癫痫、反而抑制胆碱酯酶活性

中东的海:东莨菪碱、苯海索

②中枢性抗胆碱药：如**东莨菪碱**，可缓解**中枢**症状（中东）（复习《生理学》：东莨菪碱可治疗帕金森）

③外周性抗胆碱药：如**阿托品、山莨菪碱**，可缓解外周 **M** 样症状（M 像山）



④新型选择性抗胆碱药盐酸戊乙奎醚：较阿托品强、持续时间长、不增加心率和心肌耗氧（对心脏 M_2 受体作用极弱）五一窥秘小心 对心脏几乎没有影响

（3）使用阿托品后可致阿托品化、阿托品中毒

有机磷中毒	**阿托品化**（已达治疗剂量→需减量或停用）	**阿托品中毒**（验尿中）
针尖样瞳孔	**瞳孔扩大**	瞳孔明显扩大
大汗流涎 肺啰音	皮肤干燥**无汗**、**口干**、肺啰音**消失** **颜面潮红**（阿托品阻断 M-R→汗腺分泌↓→为了散热→皮肤血管舒张）	**尿潴留** **中枢症状**如抽搐昏迷、
心率↓	**心率↑（90-100 次/分）**相比之前的心率增加	烦躁不安、神志模糊

你是我的阿托品：瞳孔扩大是你、心跳加速是你、颜面潮红是你、…的也是你（口诀仅记忆）

（4）其它表现

①**中间型**综合征：中毒后约 1-4 **天**，经治疗胆碱能危象消失，突然出现上睑下垂、面瘫、呼吸肌麻痹等，**胆碱酯酶＜30%**（胆碱酯酶复活药用量不足）。立即**机械通气**（易中天）

②**迟发**性多发神经病：症状消失后约 2-3 **周**，四肢肌肉萎缩等，胆碱酯酶活力正常、而**神经靶酯酶异常**（周星驰把妹 1234）

③反跳现象：乐果、马拉硫磷中毒者病情好转后可突然恶化或死亡，残留在体内的 OPI 重吸收或停药过早所致（快乐的跳马）

专题串联 • 吗啡和纳洛酮

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

1.吗啡

陈施呼吸,呼吸像潮水　间停呼吸(几次规律呼吸后突然停止一段时间又开始呼吸)

①中毒表现：**针尖样瞳孔、呼吸减慢、潮式呼吸、比奥呼吸、血压明显下降、昏迷**

脑袋被严重抑制,eg脑出血、吗啡能扩A
脑梗死、镇静催眠剂中毒

②中毒解救：**纳洛酮**（哪里痛）

止痛　镇静/扩A降低后负荷　VS 慢性左心衰:抗重构

③适合吗啡：**急性心梗、急性左心衰/心源性哮喘、癌症第三阶梯止痛**（定期给药）

强心利尿打吗啡

拔萝卜　会导致Oddi括约肌痉挛　再抑制中枢就真的安静了了

④**禁用吗啡**：**分娩**镇痛（可用罗哌卡因或布比卡因）、**急性胰腺炎**严重腹痛镇痛（可用哌替啶）、**肝性脑病**烦躁抽搐镇静（可用抗组胺药如异丙嗪或氯苯那敏/扑尔敏）、**中毒性巨结肠**、**呼吸系统疾病**镇咳

扑翼　导致麻痹性肠梗阻　抑制呼吸中枢

中毒性巨结肠诱因:钡灌肠、抗胆碱药、吗啡、低钾