93.该患者最可能的诊断是
A.扩张型心肌病
B.心瓣膜病
C.心包积液
D.冠状动脉性心脏病
94.为明确诊断，最有价值的检查是
A.动态心电图
B.超声心动图
C.胸部 X 线片
D.冠状动脉 CT
95.该患者心律不整最可能的类型是
A.心房颤动
B.窦性心律不齐
C.阵发性室上性心动过速
D.频发期前收缩

2. 2015N61 A 男性，53 岁，1 个月来活动后气短、心悸，自觉体力明显下降。偶有夜间憋醒，坐起休息后可缓解。有高血压病史 1 年，最高血压达 150/90mmHg，吸烟 25 年。查体：P 88 次/分，BP 130/80mmHg，平卧位颈静脉充盈，双肺底可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心率 108 次/分，心律不整，心音强弱不等，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下可及，下肢水肿(±)。首先可排除的是
A.风湿性心瓣膜病
B.扩张型心肌病
C.冠心病
D.心包积液

左心衰的表现
心包积液/扩心病
体循环回流腹碍
房颤
相对性二闭(功能性)
杂音不像(风湿性心瓣膜病是器质性杂音)、性别不像(风湿病女性多见)、风湿病的二闭是左心大、风湿病发展为二闭需要很多年,再发展到右心时间更长(题目一个月就有这些表现)、风湿病累及全身常有关节病
有种类型的临床表现与扩心病相似
1、2级→功能性杂音
3级→功能/器质性杂音
4、5、6级→器质性杂音
改:首先考虑的疾病是B
主诉强调左心衰、肺有问题,发展到了右心衰

3. 2017N76-78 A 男性，46 岁。两个月来渐进性乏力，活动后呼吸困难。2 周来上感后不能平卧，下肢水肿。既往有肺结核病史，吸烟 25 年。查体：T 37.8℃、H 104 次/分、R 18 次/分、血压 95/85mmHg，半卧位，口唇轻度发绀，颈静脉怒张，双肺未闻及干湿性啰音，心界向两侧扩大，心律齐，脉搏随呼吸强弱不等，肝肋下 2cm，下肢凹陷性水肿(++)。
76.该患者最有可能的诊断是
A.扩张型心肌病
B.急性心肌炎
C.心包积液
D.心力衰竭
77.为明确诊断，最有价值的检查为
A.X 线胸片
B.心电图
C.超声心动图
D.心肌损伤标志物检测
78.对该患者采取最关键的治疗方法是
A.心包穿刺术
B.应用静脉血管舒张剂

优先考虑心包积液
心包积液/扩心病
奇脉(吸停脉)

答案:2-3 A CCA