C.应用静脉心肌营养药物
D.应用正性肌力药物

4. 2018N155 X 心脏压塞的主要体征有
A.奇脉
B.心界扩大
C.血压下降，脉压增大 脉压低
D.心率加快，心音减弱 动用心率储备

以题带动 知识点复习

5. 2019N42 A 胸膜摩擦音与心包摩擦音最重要的鉴别点在于
A.听诊部位不同
B.与呼吸运动的关系
C.与体位的关系
D.摩擦音性质的不同

6. 2020N128-129 B
A.急性心包炎
B.急性心肌炎
C.心脏压塞
D.急性感染性心内膜炎
男性，52 岁，10 天前发热、咽痛，1 天来突感心前区锐痛，呈持续性，向左肩放射，活动时加重。既往有高血压病 6 年。查体：T 37.5℃，P 88 次/分，BP 160/90mmHg，双肺(-)，胸骨左缘 3、4 肋间可闻及粗糙抓刮样音，收缩期明显，双侧脉搏对称。该患者最可能的诊断是 循环系统中有1-3周的前驱感染:急非特、病毒性心肌炎
消化道前驱感染
女性，46 岁。10 天前有发热、恶心、腹泻，2 天来心悸伴心前区闷痛，活动后明显加重，夜间睡眠中有憋气感，既往体健。查体：T 37.6℃，P 110 次/分，BP 110/65mmHg，双肺底偶闻及湿啰音，心律整，心尖部可闻及 S_3 奔马律，肝未及。该患者最可能的诊断是

主诉:体循环障碍
7. 2022N48 A 男，20 岁。渐进性心悸、乏力、消瘦 6 个月，腹胀、下肢水肿 2 个月。查体：T 37.2℃，P 106 次/分，BP 90/75mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺(-)，心界向两侧扩大，心律整，心音遥远，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，脉搏减弱，肝颈静脉回流征(+)，双下肢凹陷性水肿(+)。该患者最可能的诊断是
功能性杂音（无特异性）
A.心包积液
Beck三联征:动脉压低,静脉压高,心音低弱遥远,颈静脉怒张
B.风湿性心瓣膜病
C.扩张型心肌病
D.病毒性心肌炎

主诉:体循环障碍
8. 2024N76-78 A 男性，60 岁。3 个月来乏力，1 个月来出现渐进性呼吸困难、腹胀、食欲下降、尿少、便秘、下肢水肿。无胸痛，无发热。既往有慢性支气管炎 30 年，饮酒史 20 年。查体：T 36.5 度，P 102 次/分，BP 90/80mmHg，表情淡漠，轻度贫血貌，颈静脉怒张，双肺(-)，心界明显向两侧扩大，心音低，肝肋下 3cm，双下肢可凹性水肿(++)，深吸气时脉搏消失。奇脉
心包积液/扩心病
76.导致目前临床表现最可能的原因是
A.全心衰竭
B.呼吸衰竭