

3.选药（注意禁忌症）

	用	不用
无合并症的老年（盐敏感）	利尿剂、CCB（①促进肾小管排水排钠 ②对血糖、血脂、尿酸无影响）	
蛋白尿、糖尿病	ACEI/ARB（选择性舒张出球A，增敏胰岛素，减少尿蛋白排泄）	
痛风	促进尿酸排泄 ARB、CCB	氢氯噻嗪（高尿酸血症） 吡嗪酰胺（高尿酸血症）
冠心病	抗重构 β-R 阻断剂、ACEI/ARB、维拉帕米	
心率慢	二氢吡啶类CCB 氨氯地平 反射性加快心率	
支气管哮喘、变异型心绞痛、雷诺病（平滑肌痉挛）	CCB	β-R 阻断剂（加重痉挛）
前列腺肥大	②XX 唑嗪（不单用）	CCB

①非那雄胺—抑制5α还原酶阻止双氢睾酮生成　选择性α1受体拮抗剂 尿道括约肌松弛　抑制平滑肌收缩

五、继发性高血压举例

1.肾实质高血压（最常见的继发性高血压）


①多见于慢性肾小球肾炎（水钠潴留、RAAS 激活）

②肾穿刺活检是确定肾小球疾病病理类型的必需手段


2.肾血管性高血压（肾动脉狭窄→肾缺血→激活 RAAS）

①上腹或背部肋脊角闻及血管杂音，肾动脉造影确诊　肾A主干或大分支狭窄

②双侧肾动脉狭窄、或肾功能已受损禁用 ACEI/ARB　血肌酐>265



3.主动脉缩窄：上肢血压增高、下肢血压不高或降低（上肢血压明显高于下肢），主动脉增强 CT 或造影确诊　一般在降主动脉处发生狭窄



真题解析·高血压

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1.2013N139-140 B

A.血管紧张素转换酶抑制剂

B.钙通道阻滞剂

C.β 受体阻滞剂

D.噻嗪类利尿剂

高血压病并发 2 型糖尿病患者首选的药物是

变异型心绞痛并发高血压患者禁用的药物是　冠脉痉挛　2234 都积极笑、变异咯

2.2016N61 A 以下关于高血压急症治疗原则的说法中，错误的是

A.使用静脉制剂快速降压

B.60 分钟内降压幅度不超过 25%

C.2-6 小时内将血压降至正常水平 安全水平160/100

D.无临床症状及靶器官损害证据者，可采取口服降压药治疗　亚急症可口服快速起效降压药CCB

3.2018N48 A 女性，48 岁，高血压 8 年，BP 最高达 180/100mmHg，长期口服吲哒帕胺（噻嗪类利尿剂-低钾血症），血压基本正常。1 周前患急性胃肠炎（前驱感染），后感发作性心悸，胸闷，乏力，BP 140/85mmHg，心电图示心率 82 次/分，频发室性期前收缩，二联律。患者近 1 周病情变化最可能的原因是 无论高钾低钾心肌兴奋性都会先增高后降低　腹泻加重低钾血症

A.并发急性心肌炎 1-3周前驱感染后出现胸痛,左心功能不全(肺问题)

答案：1-3 AC C B