B.并发低钾血症
C.冠状动脉缺血
D.血压控制差

4.2020N48 A 男性，72 岁。患有高血压 20 年，糖尿病 15 年。近 2 年活动能力明显下降，上 2 层楼即感气短。查体：双肺底可闻及湿啰音，心率 78 次/分，下肢无水肿。HbA1c 7.8%，NT-proBNP 865pg/ml，eGFR 48ml/min·1.73m^2。该患者血压控制的目标值在
糖肾心心小三八
A.＜130/80mmHg
B.＜130/90mmHg
C.＜140/90mmHg
D.＜150/90mmHg

5.2021N45 A 男性，60 岁。高血压病 20 余年，血压最高 190/100mmHg，无自觉不适，未规律治疗，来院健康体检：P 62 次/分，BP 180/90mmHg，心肺(-)。化验：尿蛋白(+)，血 TC 6.4mmol/L，HDL-C 0.98mmol/L，LDL-C 4.96mmol/L，Glu 8.6mmol/L，Cr 122μmol/L，UA 365μmol/L。该患者应首选的降压药是
血脂高
血糖↑
A.培哚普利
B.氨氯地平
C.吲达帕胺 不降脂
D.比索洛尔
硝普钠❌不是高血压危象

6.2023N48 A 24 小时动态血压检查诊断高血压的标准值（白天与夜间的平均血压）是
A.白天≥140/90mmHg 和（或）夜间≥130/90mmHg
B.白天≥140/80mmHg 和（或）夜间≥130/80mmHg
C.白天≥135/85mmHg 和（或）夜间≥120/70mmHg 白天和夜晚血压不可能一样
D.白天≥130/80mmHg 和（或）夜间≥120/80mmHg

急性靶器官损害
7.2024N155 X 鉴别高血压急症与亚急症的标准有
A.血压是否大于 180/120mmHg
B.是否伴有急性心力衰竭
C.是否伴有高血压脑病
D.是否伴有明显发病诱因

8.2025N47 A 男性，50 岁。1 小时前因情绪激动突感胸闷、呼吸困难、咳嗽、咳泡沫样痰，急送来院。既往有高血压病 15 年，陈旧心肌梗死 4 年。查体：BP 196/108mmHg，半卧位，双肺可闻及湿啰音，心率 112 次/分，心律齐。应选择的最佳治疗药物是
A.尼卡地平
B.硝酸甘油
C.硝普钠 高血压急症→急性左心衰
D.多巴酚丁胺