随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

## 真题解析·心瓣膜病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点


1. 2013N58 A 以下关于二尖瓣狭窄心尖部舒张期杂音听诊特点的叙述中，正确的是

A.强度不受呼吸影响 大部分杂音都在呼气增强,心脏与胸壁更近;与右心相关的杂音多在吸气增强

B.为全舒张期 舒张中晚期

C.向剑突方向传导 二狭不传导

D.多为递增递减型 递增





2. 2013N169 X 严重主动脉瓣狭窄引起心肌缺血的机制包括

A.冠状动脉灌注压降低

B.左心室舒张末容积减小 早期是向心性肥厚:左心室容积正常/减少 但与心肌缺血没关,后期离心性肥大有关

C.左心室壁毛细血管密度相对减少

D.左心室射血时间延长，心肌耗氧增加 供氧耗氧不匹配 后负荷↑




3. 2014N139-140 B

A.二尖瓣关闭不全

B.二尖瓣狭窄 衰了疯了

C.主动脉瓣狭窄

D.肺动脉瓣狭窄

最容易并发感染性心内膜炎的瓣膜损害是

最容易并发心房颤动的瓣膜损害是

4. 2018N42 A 可能在心尖部听到舒张期隆隆样杂音的病变是

A.动脉导管未闭 二尖瓣狭窄(A-F杂音)

B.室间隔缺损

C.主动脉瓣关闭不全 内-粘液瘤、外-缩心炎、下面很多血抬起来(主闭) 上面很多血流进来-回心血量多(甲亢/贫血我要O2)

D.肺动脉瓣关闭不全

5. 2019N128-129 B

A.主动脉瓣关闭不全

B.主动脉瓣狭窄

C.二尖瓣狭窄

D.二尖瓣关闭不全

最易发生左心功能不全临床表现的心脏瓣膜病是

最易引发左心室肥厚临床表现的心脏瓣膜病是

以题带动 知识点复习

6. 2020N70-72 A 女性，28 岁。既往反复扁桃体炎史。查体：T 36.2℃，P 78 次/分，R 16 次/分，BP 120/70mmHg。双侧扁桃体II度肿大，双肺(-)，心尖搏动位于左侧第五肋间锁骨中线上，心律整，心尖部可闻及舒张期隆隆样杂音，左侧卧位时杂音更明显。 右心室变大发生顺钟向转位

70.该患者心脏存在的器质性病变是 改:胸骨左缘2肋间舒张早期叹气样杂音,吸气时增强,该患者存在的心脏器质性病变是?B

A.肺动脉瓣狭窄

G-S杂音:二狭→肺动脉高压→肺动脉扩张→相对性肺闭(与右心相关杂音在吸气时增强)

A、二狭合并肺闭

B、二狭

C、肺闭

答案:1-6 无答案 ACD AB ABC都对(C更好) CB BAC