内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·冠心病

（性感认识：学成选择题）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、基础知识

（一）冠心病的分类

1.**急性冠脉综合征**（acute coronary syndrome,**ACS**）

①**不稳定型心绞痛**（unstable angina,UA）

②**非 ST 段抬高型心肌梗死**（non-ST-segment elevation myocardial infarction,NSTEMI）

③**ST 段抬高型心肌梗死**（STEMI）

④**猝死**

2.慢性冠脉综合征（chronic coronary syndrome,CCS）

①稳定型心绞痛

②隐匿型/无症状性冠心病：没有心绞痛症状，但有心肌缺血的客观证据

③缺血性心肌病：属于冠心病的晚期阶段，患者既往曾发生过急性冠脉综合征，与扩张型心肌病有类似临床表现

左心衰表现

2015N61 A 男性，53 岁，1 个月来活动后气短、心悸，自觉体力明显下降。偶有夜间憋醒，坐起休息后可缓解。有高血压病史 1 年，最高血压达 150/90mmHg，吸烟 25 年，查体：P 88 次/分，BP 130/80mmHg，平卧位颈静脉充盈，双肺底可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心率 108 次/分，心律不整，心音强弱不等，心尖部可闻及 2/6 级收缩期吹风样杂音，肝肋下可及，下肢水肿(±)。首先可排除的是

功能性二闭

A.风湿性心瓣膜病 阳间病例题:心界向两侧扩大优先考虑心包积液/扩心病,若肺部有问题优先考虑扩心病

B.扩张型心肌病

C.冠心病 不能排除CCS中的缺血性心肌病

D.心包积液

心包积液、缩心炎、限心病:都限制了心脏的舒张,无论是左心还是右心都是被限制的,但由于肺循环容量较小,体循环容量较大,所以表现为体循环回流障碍



（二）冠心病最常见的病因是冠状动脉粥样硬化

1.动脉粥样硬化的危险因素：中老年男性，高血脂、高血压、糖尿病、吸烟、甲减等

也是主动脉瓣狭窄的危险因素

血胆固醇↑

甲状腺激素促进脂类分解>合成

《病理学》：总胆固醇 TC、甘油三酯 TG、低密度脂蛋白胆固醇 LDL-C、极低密度脂蛋白 VLDL、乳糜微粒 CM、载脂蛋白 apoB 增高，而高密度脂蛋白 HDL、载脂蛋白 apoA 降低。以 ox-LDL-C（TCL）最重要

主要存在于HDL

含有apoB48

生理:小肠上皮细胞将脂类物质吸收后与apoB48结合形成乳糜微粒

2.动脉粥样硬化的发病机制

“异物”

血管内皮细胞受到慢性反复损伤→血管内的脂类物质沉积于血管内膜

→单核-巨噬细胞、平滑肌细胞摄取脂类

→泡沫细胞大量聚集形成脂纹（动脉粥样硬化最早的病理变化）

→SMC 产生胶原纤维等细胞外基质使脂纹纤维化变为纤维斑块（形成纤维帽）

→粥样斑块/粥瘤




图 9-3 泡沫细胞

泡沫细胞体积大，胞质呈空泡状。