
随课更新　　配套anki　　定期答疑　　公众号小凯的医学之路　　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

eg.初发型心绞痛:首发症状在1-2个月内出现,属于不稳定型心绞痛(纤维帽较薄)

3.动脉粥样硬化的两类斑块 时间长,纤维帽增厚

稳定型斑块“皮厚馅少”	不稳定型/易损型斑块“皮薄馅多”
纤维帽厚、脂质少	纤维帽薄、脂质多
一般见于病变时间较长者	一般见于病变时间较短者
导致固定狭窄引起稳定型心绞痛	易破裂导致急性冠脉综合征





4.斑块的继发改变：①形成溃疡继发血栓形成 ②脂质进入血液循环造成栓塞　瘤样扩张


斑块内出血、斑块（纤维帽）破裂、营养不良性钙化、动脉瘤、血栓形成、动脉狭窄、栓塞（血栓栓子、ttsx 胆固醇栓子）、梗死





斑块-饺子
纤维帽-饺子皮
里面的脂质-饺子馅














图 9-1　动脉粥样硬化发病机制示意图

低密度脂蛋白（LDL）通过内皮细胞渗入内皮下间隙，单核细胞迁入内膜；氧化 LDL（ox-LDL）与巨噬细胞表面的清道夫受体结合而被摄取，形成巨噬细胞源性泡沫细胞；动脉中膜的平滑肌细胞（SMC）经内弹力膜窗孔迁入内膜，吞噬脂质形成肌源性泡沫细胞；SMC 增生迁移，合成细胞外基质，形成纤维帽；ox-LDL 使泡沫细胞坏死崩解，形成糜粥样坏死物，粥样斑块形成。