



图 3-4-1　动脉壁结构示意图
显示动脉壁内膜、中膜和外膜三层结构，右下角是局部再放大示意。






图 3-4-2　动脉粥样硬化的发生和发展
A. 动脉粥样硬化斑块结构示意图：显示粥样斑块的纤维帽和它所覆盖的脂质池。B. 动脉粥样硬化进展过程血管横切面结构示意图：图中深黑色代表血栓、钙化，淡黑色代表脂质条纹、脂质核和脂质池，细黑点代表纤维帽。






图 9-5　斑块内出血
A—血管腔；B—出血（箭头示）。
斑块内血管破裂，形成血肿，致管腔进一步狭窄。





左室压力大，长期搏动

5.冠状动脉粥样硬化性心脏病以左前降支最常见、尤其心壁侧



《生理学》：可使冠脉流量↑的有舒张期↑（心率↓）、动脉舒张压↑、腺苷、NO、CGRP、ADM 等
β受体拮抗剂减慢心率延长舒张期　冠脉开口于主动脉根部　扩血管
↑
硝酸酯可代谢生成NO

eg.主闭：主动脉不仅往外周流血还通过没有关全的主动脉瓣反流到左心室→动脉舒张压显著下降→冠脉流量↓→心绞痛