2.心电图运动负荷试验 稳定型心绞痛病情稳定时做

①阳性标准：运动中出现典型心绞痛、ST 段水平或下斜形**压低≥0.1**mv 并持续 2 分钟

②**禁忌症**：不稳定型心绞痛、急性心肌梗死、明显心衰、严重心律失常、急性疾病



洋地黄效应(用过洋地黄)



急性心包炎　病情凶险

3.心电图连续动态监测 Holter：胸痛发作时相应时间缺血性 ST-T 改变，既有助于诊断心绞痛、又可检出无痛性心肌缺血（**隐匿型冠心病**）

4.急性 ST 段抬高型心肌梗死的心电图

冠脉完全闭塞　　冠脉完全闭塞+持续时间数小时

（1）**特征表现**：T 波倒置（全层缺血）、**ST 段弓背向上抬高**（全层缺血损伤）、**病理 Q 波**（全层坏死）

都是　变异型心绞痛、STEMI　STEMI




图 3-4-10　急性前壁心肌梗死的心电图

图示 V_1～V_5 导联 QRS 波群呈 QS 型，ST 段明显抬高。




图 3-4-11　急性下壁心肌梗死的心电图

图示Ⅱ、Ⅲ、aVF 导联 ST 段抬高。