抗板

阿姨　两个格格

①稳定型心绞痛：阿司匹林或吲哚布芬（抑制 COX-1），支架植入加替格瑞洛或氯吡格雷（拮抗 P_2Y_{12}/血小板 ADP 受体）

②急性冠脉综合征：**阿司匹林或吲哚布芬+替格瑞洛或氯吡格雷双联抗血小板＞1 年。PCI 术中追加替罗非班或阿昔单抗（拮抗血小板 GPIIb/IIIa 受体）**

真题解析·冠心病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点　心包摩擦音↑　左心功能不全↑

心悸跟体温不相称　优先考虑急非特、病毒性心肌炎

1.2012N62 A 女性，22 岁，三天来感心悸伴胸闷，活动后明显，时有阵发性胸痛，呈针刺样，体力下降。三周前有上感发热、咽痛史，既往体健。查体：T 37.2℃，P 120 次/分，R 18 次/分，BP 100/70mmHg，平卧位，颈静脉无怒张，甲状腺I度肿大，双肺底可闻及散在湿啰音，心率 120 次/分，心律整，S_1 低钝，可闻及奔马律，P_2＞A_2，肝未及，下肢不肿。该患者最可能的诊断是 心肌炎肌钙蛋白也可↑

A.急性心包炎
B.急性心肌炎
C.急性冠脉综合症
D.甲状腺功能亢进症

2.2013N61 A 急性非 ST 段抬高心肌梗死治疗时，不宜采用溶栓疗法的主要原因是　溶已经形成了的纤维蛋白

A.冠脉内主要是白血栓
B.冠脉阻塞不完全
C.冠脉痉挛是发病的主要原因
D.病情危急程度较轻

首选和最佳检查是心肌坏死标志物

3.2014N60 A 判断一患者是否在 1 周前左右发生急性心肌梗死，最有价值的检查是

A.超声心动图①诊断心梗的并发症
B.冠状动脉造影 确诊冠心病首选:CTA金标准DSA
C.肌钙蛋白测定 持续1-2周
D.心肌核素显像 灌注缺损显示缺血或梗死区域(瘢痕)

肺栓塞可以晕厥作为首发症状

4.2014N96-98 A 男性，75 岁。下肢骨折术后 1 周突发呼吸困难，晕厥 1 次，查体：BP 85/55mmHg，口唇发绀，颈静脉充盈，肺动脉瓣区第二心音亢进。P2亢进→肺A高压　高危肺栓塞

96.该患者最可能的诊断是　如果是ST段抬高型心肌梗死要考虑溶栓禁忌症,此时不能溶栓(下肢骨折术后)

A.急性心肌梗死
B.心律失常
C.主动脉夹层
D.肺栓塞

97.对诊断该患者疾病最有价值的是

A.心电图
B.血气分析
C.CT 肺动脉造影
D.超声心动图

答案：1-4 B A C DCD