98.该患者首选的治疗是

A.起搏器置入

B.外科手术

C.介入治疗

D.溶栓治疗



5.2014N169 X 男性，50 岁。4 小时来急性胸痛，心电图诊断为“急性下壁、右心室心肌梗死”。患者胸痛持续不缓解，查体：BP 85/60mmHg，颈静脉充盈，下肢水肿(+)。以下治疗方法中，正确的有

A.适当的利尿，消除水肿

B.积极补液，适当应用多巴胺升血压 首要关键措施

C.即刻行 PCI 术血运重建 根本关键措施

D.静点硝酸甘油以缓解心绞痛

发作频率高→不稳定型心绞痛

6.2015N59 A 男性，56 岁，近 1 个月来反复出现发作性胸部压抑感，自咽喉部放射，持续约 10 分钟可自行缓解，既往高血压、糖尿病病史，吸烟 35 年。为明确诊断，不宜进行的检查是

A.24 小时动态心电图


B.冠状动脉 CT

C.冠状动脉造影

D.心电图活动平板负荷试验

7.2015N91-92 A 男性，72 岁。因胸痛 24 小时，诊断急性前壁心肌梗死入院，按常规接受药物治疗。入院后第 4 天，患者再次感心前区疼痛，持续约 30 分钟，查体：心尖部内侧闻及收缩中晚期高调短促附加音伴收缩晚期杂音，与呼吸运动无关。

二脱
二闭



91.该患者新出现的附加音最可能是

A.第四心音 奔马律→舒张期额外心音

B.开瓣音 舒张期额外心音

C.喀喇音 收缩期额外心音

D.心包摩擦音

92.出现附加音最可能的病因是

A.心力衰竭

B.心室壁瘤

C.二尖瓣脱垂

D.渗出性心包炎

8.2015N169 X 急性胸痛患者，鉴别急性心肌梗死与主动脉夹层有意义的临床表现有

A.疼痛持续时间 疼痛性质✓

B.合并消化道症状

C.心肌坏死标记物

D.主动脉瓣区杂音