B.冠状动脉造影 有创,不能作为首选
C.肺通气灌注检查 肺栓塞
D.运动负荷心电图

13.2020N47 A 男性，60 岁，突发左胸持续压榨性疼痛伴大汗 3 小时。自含速效救心丸无效，急送来院。查体：P 85 次/分，BP 80/50mmHg，神清，四肢皮肤发凉，双肺未闻及啰音，心律不整，心尖部 S_1 低钝。心电图示：窦性心律，偶发房性早搏，I、aVL、V_2-V_6 导联 ST 段抬高，T 波倒置。下列急诊处理正确的是
A.积极静脉输液扩容
B.静脉注入利多卡因
C.静脉注入硝酸甘油
D.置入主动脉内球囊反搏

14.2021N46 A 男性，69 岁。因 2 小时前（凌晨 5 点）在睡眠中突发心前区疼痛伴大汗，自服速效救心丸无效，凌晨 7 点急送来院。即刻作心电图：II、III、aVF 导联 ST 段弓背向上抬高 0.2-0.4mv。采血检查，最可能异常的项目是
A.肌钙蛋白 T
B.谷草转氨酶
C.肌酸激酶同工酶 CK-MB
D.肌红蛋白

	肌红蛋白 SMB	肌钙蛋白 cTn	肌酸激酶同工酶 CK-MB
升高	最早（2 小时内）	3-4 小时后	4 小时内
恢复	最早（1-2 天）	最晚（持续 1-2 周）	3-4 天
意义	敏感性最高 （红枣）	特异性最高 最有价值	敏感性、特异性均可 ①1-2 周内诊断再发心梗 1-2周肌钙蛋白没有恢复 ②较准确反映梗死范围 ③高峰提前出现（<14 小时）间接判断溶栓再通

脉压↑:老高闭闭闭

15.2021N48 A 女性，46 岁。因活动后心前区疼痛 2 个月，每次自含硝酸甘油无效来诊。既往有高血压、关节炎史。查体：P 80 次/分，BP 150/65mmHg，BMI 35kg/m²。甲状腺无肿大，双肺(-)，心律整，心界向左扩大，心尖部 S_1 减弱，可闻及舒张早中期隆隆样杂音，胸骨左缘第 3 肋间闻及舒张期叹气样杂音，双下肢水肿(±)。该患者心前区疼痛的最主要病因是
脉压85
相对性二狭 ← 主闭
(A-F杂音)
A.二尖瓣狭窄
B.冠心病，高血压病
C.肥厚型梗阻性心肌病
D.主动脉瓣关闭不全

稳定型心绞痛
发作频率出现变化
16.2022N76-78 A 男，65 岁。一年来快跑时感心前区闷痛，持续 3-5 分钟，休息即可缓解。近一个月来快步行走或上二层楼后即出现胸痛，疼痛较前加重，可持续 10 分钟左右，伴出汗。一天前再次发作，口含硝酸甘油可缓解，胸痛发作时可见心电图有 ST-T 改变，诊断为冠心病。
发作频率高→不稳定型心绞痛
76.该患者冠心病的分型是
A.稳定型心绞痛
B.不稳定型心绞痛
C.非 ST 段抬高型心肌梗死
D.急性 ST 段抬高型心肌梗死
77.根据加拿大心血管病学会（CCS）分级，该患者疾病严重度是 200米,一层楼
A.I 级
B.II 级
C.III 级
D.IV 级
78.该患者最佳治疗选择为

答案：13-16 D D D BBC