A.溶栓治疗
B.长效硝酸甘油口服
C.PCI 术
D.加用 β 受体拮抗剂

17.2023N46 A 男性，65 岁。4 小时前突发胸痛，持续不缓解，外院确诊为“急性下壁、右室心肌梗死”即转入院。查体：BP 82/55mmHg，神清，双肺(-)，心率 54 次/分，心律齐，心音低钝，四肢末梢皮温正常。此时应首先采取的治疗措施是
A.即刻静点硝酸甘油
B.静脉快速输液
C.静点多巴胺升血压
D.即刻置入临时起搏器

18.2024N46 A 男性，78 岁。6 小时前在睡眠中突发胸痛，有明显压迫感，自含硝酸甘油 2 片，症状稍有缓解。2 小时前胸痛再次加重，持续不缓解伴呼吸困难而来院。既往有高血压病 20 年，糖尿病 18 年。查体：R 20 次/分，BP 88/50mmHg，口唇发绀，双肺满布湿啰音，心率 106 次/分，心律齐，心音低钝，四肢末梢皮肤湿凉。心电图示 V_{2-6}、I、aVL 导联 ST 段水平下移 0.2-0.4mv，T 波倒置，cTnT 1.58μg/L↑。对该患者应采取的治疗措施是
A.即刻静脉补液扩容，提升血压　非ST段抬高的心梗
B.在使用升压药的同时，即刻溶栓治疗
C.即刻在置入 IABP 同时行冠脉介入治疗 为做PCI争取时间
D.即刻给予血管扩张剂及利尿剂，控制心衰

19.2024N47 A 最能反映存在急性心肌缺血的辅助检查结果是
A.冠状动脉造影显示血管狭窄＞70% 看冠脉
B.心电图出现 ST-T 动态改变 反映缺血损伤
C.超声心动图出现弥漫性室壁运动减弱 扩心病
D.监测血压出现收缩压波动超过 40mmHg

20.2025N46 A 男性，58 岁。3 天前劳累后感胸部憋闷，咽部发紧，持续数分钟缓解，无胸痛，平日活动不受限。既往有高血压病 5 年，服药控制，无糖尿病病史，吸烟 30 年，20 支/天。查体：BP 142/88mmHg，心肺(-)。静态心电图及超声心动图正常；血脂正常；冠状动脉 CT 示右冠状动脉中段 60%狭窄。为决定该患者下一步治疗方案，首选的检查是　>50%
A.运动负荷心电图将症状与冠状动脉狭窄联系
B.动态心电图
C.动态血压
D.冠状动脉造影有创

思维导图·冠心病
思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心
微信搜一搜
天天师兄

答案：17-20 B C B A