随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4.2014N93-95 A 男性，60 岁。3 个月来自觉乏力，1 个月来出现渐进性呼吸困难、气短、腹胀、尿少、下肢水肿，体重无明显变化，无胸痛、发热等。既往有慢性支气管炎病史 30 年，饮酒史 20 年。查体：T 36.5℃，P 102 次/分，BP 90/80mmHg，轻度贫血貌，颈静脉怒张，双肺(-)，心界明显向两侧扩大，心音低，肝肋下 3.0cm，双下肢水肿(++)，深吸气时脉搏消失。吸停脉/奇脉

心包积液or扩心病

93.患者目前出现以上临床表现的最可能原因为

A.心脏压塞

B.呼吸衰竭

C.全心衰竭

D.肝脏衰竭

94.该患者应首先考虑的疾病诊断是

A.渗出性心包炎

B.酒精性心肌病

C.扩张型心肌病

D.COPD

95.为明确诊断，应选用的最简便又有价值的检查是

A.动态心电图

B.超声心动图

C.胸部 X 线片

D.胸部 CT 检查

5.2017N47 A 以下关于血浆脑钠肽（BNP）的描述中，正确的是

A.主要来源左心房 ANP

B.左心室功能不全可明显增高 室壁张力↑

C.增高可提示存在心肌损伤 红2钙3酸4 1234 心肌损伤时BNP可以增高

D.快速心房颤动时明显增高

6.2017N49 A 男性，65 岁，因心衰 2 年来院，查体：口唇稍发绀，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿啰音，心界向两侧扩大，心律整齐，心率 76 次/分，双下肢凹陷性水肿(+)。心电图示：窦性心律，完全性左束支传导阻滞，超声心动图示：左心室扩大，室壁弥漫性运动减弱伴运动不协调，LVEF 32%。该患者最佳的治疗措施是

A.CRT 药物治疗后仍有心衰表现的窦性心律、完全性左束支传导阻滞(QRS>130ms)、≤35%、NYHAII-IV级

B.联合使用正性肌力药及血管扩张药

C.联合使用 β 受体阻滞剂和利尿剂

D.长期使用醛固酮受体拮抗剂

行动、左边扇我耳屎

相对性三尖瓣关闭不全

7.2018N76-78 A 男性，55 岁，心力衰竭 3 年入院。既往有吸烟史。查体：BP 110/70mmHg，口唇稍绀，颈静脉充盈，双肺底均可闻及湿性啰音，心界向两侧扩大，心率 96 次/分，心律整，心前区可闻及 3/6 级收缩期吹风样杂音，双下肺水肿(++)。心电图示窦性心律、完全性左束支传导阻滞，超声心动图示左房、左室、右室扩大，左室壁变薄伴弥漫性运动减弱及运动不协调，LVEF 32%，NTpro-BNP 7109pg/ml（正常值＜190pg/ml）。

NYHA IV

76.该患者心力衰竭最可能的病因是

A.扩张型心肌病

B.风湿性心瓣膜病

C.肺源性心脏病

BNP增高程度与心衰严重程度呈正相关
室壁张力越高,BNP释放越多→心衰越严重,BNP越高