随课更新 配套anki 定期答疑 公众号小凯的医学之路 笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

10.2022N49 A 男，57 岁。2 天前因突发胸痛，诊断急性前壁心肌梗死，行急诊 PCI 术，血管再通成功。为评估此时患者的心脏功能，下列最有价值的血液生化检查是

A.肌钙蛋白
B.肌酸激酶同工酶
C.脑钠肽
D.乳酸脱氢酶

反映心功能:
①金标准右心漂浮Swan-Ganz导管
②心脏影像学(超声、X 线、CT、MRI、核素)
③脑钠肽
④心-肺运动试验

11.2022N128-129 B

A.替格瑞洛 氯吡格雷要经过肝脏中代谢酶才能发挥作用
B.伊伐布雷定 替代β-R拮抗剂,房颤、急性心衰不能用
C.左西孟旦
D.比伐卢定

治疗急性左心衰的正性肌力药:

	强心	扩血管
①多巴胺、酚丁胺	激动心肌β1-R	弱
②米力农	抑制PDE→心肌cAMP↑	平滑肌cAMP↑
③左西孟旦	钙增敏剂	开放血管平滑肌KATP
④强心苷	抑制心肌钠泵	X

使用时不能休克

冠心病患者冠脉内药物支架植入后，若存在氯吡格雷抵抗，可选用的药物是

冠心病患者并发急性左心衰竭，血压正常，可选用的药物是

12.2023N155 X 急性左心衰竭（急性肺水肿）可选用的治疗药物有

A.毛花苷 C
B.伊伐布雷定
C.奈西立肽
D.左西孟旦 急性左心衰可用的正性肌力药

13.2024N49 A 慢性心力衰竭应用 β 受体拮抗剂的最主要目的是

A.延缓疾病进展
B.控制心室率
C.控制心律失常
D.减少体液潴留

14.2007N141 X 关于舒张性心力衰竭的治疗原则，下列提法中正确的有

A.积极控制心动过速，增加心室充盈 如肥心病使用β-R拮抗剂
B.尽量降低心脏后负荷，~~增加心排血量~~ 改善左室肥厚✓ 用于收缩性心衰
C.应用 ACEI、钙拮抗剂，逆转左室肥厚 改善
D.合用适量地高辛可提高治疗效果

高血压→左室肥厚
(高血压早期:舒张性心衰)

肥心病 B B B B
↓ ↓
没血可射 β-R拮 维、地

思维导图 • 收缩性心衰 & 舒张性心衰

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心



微信搜一搜
天天师兄

答案：10-14 C AC ACD A AC