左束支比右束支要粗
↓
左边传导会比右边传导相对快一点
↓
左心的机械活动就要比右心的机械活动快一点
↓
左心的射血会比右心的射血快一点
↓
主动脉瓣的关闭会比肺动脉瓣关闭提前一点
↓
先听A2,再听P2(分辨不出来,统称第二心音)


窦房结通过抢先占领和超速驱动压抑让潜在的起搏点在平时只能表现出传导性,而不能表现出自律性。表现出自律性两个原因
①早搏(出现连续三个以上的早搏-心动过速)
②逸搏(出现连续三个以上的逸搏-逸搏心率)

内科学含诊断学 循环系统疾病

核心精讲·心律失常


（性感认识：感性认识比深究机制更高效）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图





肺心病→右心房大→右心房除极慢↗
二尖瓣→左心房大→左心房除极慢↘

一、心律失常的首选检查——心电图



心房激动后产生P波
右心房先除极左心房后除极






QRS波多正常(除非发生室内差异性传导)e.g房颤一般QRS波正常,但有束支阻滞的正常现象时也能看见宽大畸形的QRS波(冲动落在束支的不应期中)

1.心电图诊断：心律失常、心绞痛、心肌梗死，但对心律失常的病因评价作用较小

动态心电图 Holter 了解心悸、胸痛、晕厥等症状是否与心律失常有关

e.g 房颤:心肌病、二狭、甲亢可以导致房颤,正常人有时候也可以出现阵发性房颤

2.正常心电图（一个小格是 0.04s、0.1mv，一个大格由五个小格组成——即 0.2s、0.5mv）



窦房结激动时叫S波,但不能为常规心电图所记录,故看到第一个波为心房除极P波
心房复极波埋在PR/QRS段内,看不到