

小结：

	窦速	阵发性室上速	房扑
P 波	窦性 P 波	**逆行 P'波或无 P 波**	**规则的 F 波**
等电位线	有	有	**无**
心率	房室率相等 心室率＞100 次/分	房室率相等 心室率多 **160-250** 次/分	心房率＞心室率 心室率与下传情况有关
心律	规则	**绝对规则**	规则或不规则

八、房颤

（一）病因

①引起房颤最常见的心脏疾病：风湿性二尖瓣狭窄　四个瓣膜病中,二狭最容易导致房颤

②引起房颤最常见的心外疾病：**甲亢**（治疗原发病）

③房颤也可发生在正常人，将发生在无心脏病的中青年者称为孤立性房颤（被有心脏病的老年人孤立了）

（二）分类

看发作的时候持续了多久(看持续时间、不是确诊时间)

阵发性房颤	持续≤1 周（常≤48h），能自行终止	自己好的了
持续性房颤	持续＞1 周，不能自行终止	自己好不了、但能治好
持久性房颤	持续＞1 年，有望转复	不好治
永久性房颤	持续＞1 年，不能终止或终止后 24h 内又复发，无望转复	治不好

（三）体征

心房内有一大堆乱七八糟的折返环

①**心律绝对不齐**（对比：阵发性室上速的心律绝对规则）

②**S_1 强弱不等**舒张期长短绝对不一样→心室充盈绝对不一样→二尖瓣位置高低绝对不一样

③**脉搏短绌（P＜心率）**

④**听不到 S_4**（心房失去有效收缩）

⑤心排血量至少下降 25% 失去了心房的"临门一脚"心率快→舒张期短,回血少

⑥**二尖瓣狭窄的舒张晚期杂音可消失**

二尖瓣狭窄有心尖部舒张中晚期的杂音,现在心房失去有效收缩,所以舒张晚期杂音可消失

