一度窦房阻滞S-P间期恒定延长心电图看不到S波
三度窦房阻滞S-P间期完全不恒定,心电图看不到S波,仅看到无规律P波(长PP和短PP没有倍数关系),与窦性停搏很难鉴别


窦房结→心房→心室　S波　P波　R波

十一、窦房传导阻滞

（一）二度I型房室阻滞 VS 二度I型窦房阻滞

二度I型房室阻滞	二度I型窦房阻滞
心房冲动传至心室时间逐渐延长，直到一次心房冲动不能传至心室、导致 QRS 波脱落	窦房结冲动传至心房时间逐渐延长，直到一次窦房结冲动不能传至心房、导致 P 波和 QRS 波均脱落
PR 间期进行性延长 RR 间距进行性缩短 =PP间距+PR的增量↓ 直到出现一次 QRS 波脱落 脱落 QRS 波前后 RR＜2 倍正常 PP	~~SP 间期进行性延长~~ PP 间距进行性缩短 PP=SS(窦房结正常)+SP的增量↓ 直到出现一次 P 波、QRS 波脱落 长 PP＜两个短 PP 之和

二度I型房室阻滞:长RR=2xPP+(本次PR-上次PR)=2xPP+负数→长RR<2xPP
PP=RR-(本次PR-上次PR)　长RR<2xPP<2xRR-2xPR增量　长RR<2x基本RR






图 3-3-7　二度Ⅰ型窦房传导阻滞

Ⅱ导联可见窦性 PP 间期逐渐缩短，直至出现一次长 PP 间期，长的 PP 间期（1.47 秒）短于基本 PP 间期（0.95 秒）的两倍。

（二）二度II型房室阻滞 VS 二度II型窦房阻滞

二度II型房室阻滞	二度II型窦房阻滞
心房冲动传至心室时间基本恒定，部分心房冲动不能传至心室、导致 QRS 波脱落	窦房结冲动传至心房时间基本恒定，部分窦房结冲动不能传至心房、导致 P 波和 QRS 波均脱落
PR 间期基本恒定（恒定正常或恒定延长） 部分 P 波后无 QRS 波 长RR=2xPP+PR增量 PR是恒定的→PR增量=0 长RR=2xPP=2倍(整数倍)基础RR	~~SP 间期基本恒定~~ **长 PP 与正常 PP 有倍数关系**（窦房结说我跳我的、你爱传不传） （对比：窦性停搏长 PP 与正常 PP 无倍数关系——窦房结想跳就跳、想不跳就不跳）

