
D.增加他汀类制剂

6. 2016N62 A 女性，36 岁。因偶发心悸 3 天来诊，既往有“预激综合征”（心室预激），无心动过速（AVRT）发作史。查体：P 80 次/分，BP 110/70mmHg，双肺(-)，心界不大，偶发早搏 0-3 次/分，心音正常。24 小时动态心电图示早发房性期前收缩 98 次。该患者首选的治疗方案是
A.观察病情，暂不用药
B.应用 IC 类抗心律失常药
C.选用钙通道阻滞剂
D.立即行射频消融术

7. 2018N47 A 男性，62 岁，1 周前患广泛前壁心肌梗死，左心功能不全，未接受冠脉介入治疗。4 小时前突发心动过速，心电图示 A 型预激综合征伴房颤（电复律最佳），心室率 156 次/分，该患者首选的治疗药物是
A.普罗帕酮 器质性心脏病禁用
B.美托洛尔　用普通的伊布
C.毛花苷 C
D.胺碘酮

8. 2018N49 A 以下关于持续性心房颤动患者应用华法林抗凝治疗的提法中，正确的是
A.80 岁以上的患者禁用 ≥75岁,2分　CHA2DS2-VASC评分
B.心房内径正常者可暂时不用
C.一旦并发心力衰竭应及时减量 +1分
D.需长期持续应用

9. 2018N128-129 B
A.窦性心动过速
B.阵发性室上性心动过速 RR绝对整齐
C.心房扑动 P波消失、转而形成F波（规则的锯齿状扑动波，其间等电位线/基线消失），遵循固定传导比心室率固定、心率规则
D.心房颤动 RR绝对不齐
请判读下列心电图并做出诊断



答案:6-9 A 无答案 D CB