心肌电活动和特性 ★★★（0~2题）

通道小结（含其他章节，2006）

	机制	大量激活	阻断剂
INa	神经和骨骼肌细胞 0 期 心肌快反应细胞 0 期等	去极化至 -55mV 去极化至 -70mV	河豚毒 TTX（对神经细胞、骨骼肌敏感性高） Ⅰ类抗心律失常药
If	心肌自律细胞 4 期	复极化至 -60mV 开始激活 超极化至 -100mV 大量激活	铯、伊伐布雷定（抑制窦房结）
ICa-L	心肌慢反应和消化道平滑肌细胞 0 期 心肌快反应细胞 2 期等	去极化至 -40mV	Ⅳ类抗心律失常药 CCB 如维拉帕米、锰
ICa-T	窦房结 4 期	自动去极化至 -50mV	镍
IK1	心肌细胞静息 / 最大复极电位 心肌快反应细胞 2、3 期		钡“宝贝别内向”
IK	复极化 心肌自律细胞 4 期等		Ⅲ类抗心律失常药如胺碘酮、四乙铵、E-4031
Ito	心肌快反应细胞 1 期		氨基吡啶
IK-ACh	心房肌、窦房结		
IK-ATP	胰岛 B 细胞等		磺脲类、格列奈类降糖药