- 泌尿概述 ★☆☆（0~2 题）
  - 肾内分泌功能（1998）
    - ①肾素：球旁 / 近球 / 颗粒细胞
    - ② 1α- 羟化酶：肾小管上皮细胞
    - ③ EPO：间质细胞
    - ④前列腺素、激肽释放酶
  - 肾单位
    - 肾小体（肾小球 + 肾小囊）：滤过
    - 肾小管（与集合管一起完成重吸收和分泌等）
    - 皮质肾单位
      - 入球动脉口径比出球动脉大→利于滤过
      - 管周毛细血管→利于重吸收
    - 近髓肾单位
      - 管周毛细血管（网状小血管）→利于重吸收
      - U 型直小血管→利于维持肾髓质间质高渗（2022）
  - 肾血流量（2022）
    - 神经调节
      - 交感神经→肾血管 α_1-R
      - 交感神经→球旁细胞 β_1-R →肾素↑→激活 RAAS
    - 体液调节
      - 收缩肾血管：NA、Adr、AngII、大剂量 VP、ET、腺苷
      - 舒张肾血管：NO、钠尿肽如 ANP、PG、缓激肽、小剂量多巴胺“肾都输没了 - 多拿蛋还钱”
    - 自身调节（肾动脉压在 70~180mmHg 肾血流量和 GFR 相对稳定）
      - 肌源性：入球动脉平滑肌机械门控钙通道
      - 管球反馈：若肾血流量和 GFR ↓→远曲小管致密斑 Na^+ ↓→入球动脉舒张和肾素↑（AngII ↑选择性收缩出球动脉）→肾小球毛细血管血压↑→肾血流量和 GFR ↑恢复（双肾动脉狭窄不用 ACEI/ARB 以免诱发肾衰竭）
    - 摄入高蛋白、严重高血糖→近端小管对过高的氨基酸或葡萄糖重吸收时会增加 Na^+ 重吸收→流经致密斑 Na^+ ↓→通过管球反馈使肾血流量和 GFR ↑