

泌尿概述 ★☆☆ （0~2题）
肾清除率（1998、2006、2007、2016、2023）
清除率 =GFR（菊粉更准确、内生肌酐更常用）
不被小管重吸收和分泌
清除率＞ GFR
被小管净分泌（一定被分泌、可能被重吸收）
清除率＜ GFR
被小管净重吸收（一定被重吸收、可能被分泌）
清除率 =0（葡萄糖完全被近端小管重吸收）
代表最大重吸收率
清除率代表肾血浆流量（对氨基马尿酸、碘锐特）
在肾静脉浓度接近零“马尿一点都不要姜”
①清除率 = 尿中物质浓度 × 每分钟尿量 ÷ 血浆中物质浓度“尿尿除血清”
②滤过分数 =GFR÷ 肾血浆流量，即血液流经肾脏时约 19%~20% 的血浆经肾小球滤过形成原尿。肾小球肾炎的滤过分数↓、心衰的滤过分数↑
③肾血流量 = 肾血浆流量 ÷（1-HCT）
无溶质水 / 自由水清除率反映小管保留水的能力
尿液高渗：$CH_2O$ 负值“自有高富帅保护”
尿液低渗：$CH_2O$ 正值，若小管浓缩功能减退→ $CH_2O$ 正值增大
排尿反射
①传入神经受损→膀胱充盈时不能引起张力增加（无张力膀胱）→充溢性尿失禁
②骶髓受损、传出神经盆神经受损→尿潴留
③高位脊髓受损（脊休克）→期间尿潴留“懵了”、之后尿失禁“放飞自我”