视觉（0~1题）★★★

- 入眼光线的折射主要发生在角膜前表面
- 看近物（1996、1998、2002、2005、2013、2014、2018、2021、2023）
  - 近点：做充分调节所能看清最近物体的距离
    晶状体弹性越好→调节能力越强→近点越近
    老视：晶状体弹性↓→调节能力↓→近点变远→看近物需凸透镜
  - 晶状体调节（最重要）
    - 睫状肌收缩（M-R）→睫状小带 / 悬韧带松弛→晶状体变凸
    - 使晶状体屈光度变大（折光能力变强）致物像前移至视网膜上
    - 眼科检查用扩瞳药后马托品点眼以评测在排除晶状体调节的影响后眼的折光能力
  - 瞳孔调节反射（近反射）
    - 虹膜环形肌 / 瞳孔括约肌收缩（M-R）→双侧瞳孔缩小
    - 减少球面像差色像差使成像更清晰
  - 视轴会聚（辐辏反射）
    - 内直肌收缩→物像落在双眼视网膜对称点
    - 形成单视觉以避免复视
- 瞳孔对光反射（2010、2017）
  - 强光→瞳孔缩小：防止强光损伤视网膜
    弱光→瞳孔变大：防止弱光影响视觉
  - 光照一侧眼→双眼瞳孔同时同程度缩小（互感性对光反射）
  - 中枢在中脑：判断病情程度和麻醉深度

折光异常 / 屈光不正（2007、2012）

	特点	矫正
远视	眼球前后径过短或折光能力过弱→看近物远物都需调节→调节疲劳、头痛“想远了就头痛”	凸透镜
近视	眼球前后径过长或折光能力过强→近点和远点均变近	凹透镜
散光	角膜或晶状体曲率不等→物像变形或不清楚	柱面镜

- 青光眼（眼压病理性升高）的治疗药物：β-R 拮抗剂、碳酸酐酶抑制剂、M-R 激动剂