

风湿病★★★（0~1题）
变态反应
A 组 β 型溶血性链球菌（2006、2018）
病理变化（1998、2003、2011、2013、2015、2024）
变质渗出期
黏液样变性、纤维素样坏死
增生期
特征：风湿肉芽肿（风湿小体/Aschoff小体）
风湿细胞：吞噬纤维素样坏死物的巨噬细胞
核的切面呈枭眼状、毛虫状、可有多核
纤维化期
风湿小体机化形成梭形小瘢痕
累及全身结缔组织（2002）
心脏
心内膜炎（最严重，2013）
累及二尖瓣（其次二尖瓣 + 主动脉瓣）→慢性心瓣膜病
McCallum 斑：瓣膜狭窄或关闭不全→受血流冲击引起心内膜灶状增厚
疣状赘生物：瓣膜闭锁缘的白色血栓（血小板为主）、不易脱落（2002、2010）
心肌炎
累及心肌间质结缔组织，间质小血管旁见 Aschoff 小体
心外膜炎 / 心包炎
心包积液（浆液为主）
绒毛心（纤维素为主）→缩窄性心包炎
关节：浆液为主（无关节畸形“舔过关节咬住心脏”，1998、2018）
皮肤：环形红斑（渗出——没有 Aschoff 小体，2016）、皮下结节（增生）
血管：小动脉为主（血管壁纤维素样坏死）
锥体外系：小舞蹈病