

高血压 ★★☆（0~1题）
缓进型 / 良性（主要）
特征
细动脉硬化 / 玻璃样变性（2000、2003、2006、2009、2010、2017）
最易累及肾入球动脉、视网膜、脾
①血浆蛋白渗入血管壁
② SMC 分泌胶原纤维等细胞外基质
③坏死 SMC 产生的修复性细胞外基质“做鬼也不放过你”
肾
原发性颗粒性固缩肾（双肾对称缩小、质硬、表面凹凸不平呈细颗粒状，1997、2006）
脑（1996、2011）
脑出血（最严重并发症和最常见死因）
基底节（尤其豆状核）、内囊多见
豆纹动脉破裂最多见（其从大脑中动脉呈直角分支）
脑水肿、高血压脑病（有时血压急剧升高可致高血压危象）
脑软化（微小梗死灶，筛网状）、胶质瘢痕、血栓形成、微小动脉瘤等
左心室
①代偿：向心性肥大（心室壁增厚、心腔相对缩小）
②失代偿：离心性肥大（心腔扩张、心肌收缩力降低）
急进型 / 恶性
特征
①坏死性细动脉炎：细动脉纤维素样坏死（2001、2003、2009）
②增生性小动脉硬化：洋葱皮 / 同心圆样
最易累及肾入球动脉
病变可波及肾小球致毛细血管袢节段性坏死
较早出现肾衰竭并发尿毒症