

动脉粥样硬化★★★（0~1题）
危险因素“没有饮酒”（1996、2000、2007）
高血脂：ox-LDL-C 最重要
高血压
吸烟
致继发性高血脂的疾病（糖尿病、高胰岛素血症、甲减、肾病综合征）
好发于中老年男性
病理变化（2000、2011）
始动细胞：内皮细胞（慢性反复损伤，2007）
最先进入血管内膜的细胞：单核细胞
最早病变（脂纹）的主要细胞：泡沫细胞（特征）（1997、2012、2015、2023、2024）
①单核 - 巨噬细胞源性
②平滑肌细胞 SMC 源性
脂纹纤维化形成纤维斑块（纤维帽）的主要细胞：平滑肌细胞（2004、2014）
斑块继发改变（1996）
斑块内出血
斑块（纤维帽）破裂形成溃疡
动脉瘤（中膜平滑肌病变）
营养不良性钙化
血栓形成等
好发于中、大动脉
最严重 - 冠状动脉左前降支尤其心壁侧（2005、2016）
心绞痛
心肌梗死（2017、2020、2025）
①梗死灶呈苍白色（贫血性梗死）
②心肌细胞 / 纤维早期凝固性坏死
③核固缩、碎裂、溶解消失，胞质均质红染或收缩带
④间质水肿、中性粒细胞浸润
⑤ 1~2 周边缘区开始出现肉芽组织、其向梗死灶内长入
⑥ 3 周后肉芽组织开始机化、逐渐形成瘢痕组织
颈内动脉起始处
大脑中动脉、基底动脉、Willis 环（2019）
主动脉的后壁及分支开口处（腹主动脉最严重）
肾动脉开口处及主动脉近侧端：大瘢痕固缩肾（1999）
下肢动脉