

病毒性肝炎 ★★★（0~2题）
肝炎病毒
HAV
HEV：合并妊娠易致暴发型 / 急性重型肝炎 wu boom
（免疫抑制患者感染 HEV 后可转为慢性肝炎甚至演变为肝硬化）
急性肝炎（2015）
HBV-DNA 病毒
（1998、2017、2024）
毛玻璃样肝细胞
（1998、2017）
嗜酸性颗粒使胞质不透明
HBsAg，滑 / 光面内质网增生（2000）
砂粒样细胞核
HBcAg，病毒复制活跃
HCV（最易转为慢性肝炎）：脂肪变性、门 / 汇管区淋巴滤泡、胆管损伤更明显（2013）
HDV
急性和慢性肝炎（2019）
变质性炎
广泛水样变性 / 细胞水肿 + 轻微点状坏死、凋亡
急性普通型肝炎 - 肝肿大
（2000、2001、2002、2009、2016）
变质
（1997）
细胞水肿
（细胞肿大
胞质疏松化
气球样变）
溶解性坏死
（液化性坏死
2003）
点状坏死
一至数个肝细胞坏死，可完全再生修复（2005、2011）
碎片状坏死
界板处肝细胞坏死，提示进入慢性肝炎（2006、2018、2025、2026）
桥接坏死
多小叶坏死形成坏死带（2023）
较重慢性肝炎特征
可致肝硬化（2014）
亚大块及大块坏死
（肝缩小）
亚急性重型肝炎
（2020）
切面呈黄绿色
亚大块坏死、网状支架塌陷
肝细胞结节状再生和纤维化（2000）
急性重型肝炎
（1999）
切面呈黄红色、质软
大块坏死、网状支架塌陷（1997、2001、2006）
仅小叶周边残留少许变性肝细胞、无明显再生（2021）
嗜酸性变
嗜酸性坏死（凋亡）形成嗜酸性小体 /Councilman body（2008、2014）
脂肪变性
渗出
淋巴细胞和单核细胞为主
增生
纤维化主要来自肝星状细胞 / 贮脂细胞