消化道肿瘤 ★★★（1题）

	食管癌	胃癌	大肠癌
好发部位	胸中段	胃窦小弯侧（2021）	直肠壶腹部（1999）
危险因素	-	Hp、慢性萎缩性胃炎尤其结肠型不完全肠化 腺瘤性息肉、胃溃疡伴异型增生等 （2005）	癌前病变：息肉病（如 FAP100% 癌变，2013）、腺瘤 慢性血吸虫病、溃疡性结肠炎等 （2000、2001、2008、2010、2011、2023）
早期	未侵犯肌层 无论有无淋巴结转移（无远处转移） 包括： ①原位癌：未突破基底膜 ②黏膜内癌：未突破黏膜肌层 ③黏膜下癌：未突破黏膜下层 （1997、1998、2004）	未侵犯肌层 无论有无淋巴结转移（无远处转移） 包括原位癌、黏膜内癌、黏膜下癌 （1999、2009、2018、2019、2020） 凹陷型 / 溃疡周边癌性糜烂（最多见） 微小癌：≤ 5mm 小胃癌：6~10mm 一点癌	肿瘤只有到达黏膜下层才是癌 否则是上皮内瘤变
中晚期大体类型	①髓质型（最多见） ②缩窄 / 硬化型：环形狭窄致梗阻 ③溃疡型：相对不易梗阻 ④蕈伞 / 隆起型 （2014）	①溃疡型（最多见） ②浸润型：可致革囊胃（预后最差） ③息肉 / 蕈伞 / 结节蕈伞型 （2015、2024）	①溃疡型（最多见） ②浸润型：多为左侧（肠梗阻、便血，2011、2015） ③息肉 / 隆起 / 蕈伞型：多为右侧（腹部肿块、全身症状）（2011） “左亲右拢溃疡多”
最常见组织学类型	鳞癌	腺癌	腺癌（1999）

转移

- **最早和最常见：淋巴转移（食管癌和胃癌晚期易转移至左锁骨上淋巴结的 Virchow，2022）**
- **晚期血道转移（胃癌和大肠癌易转移至肝）**
- **种植性转移：尤其胃印戒细胞癌（属于低黏附性癌）转移至双侧卵巢形成 Krukenberg 瘤（2015、2025）**

（1999）	
胃溃疡“乖”	**胃癌溃疡型**
圆形或椭圆形，边缘整齐，多＜ 2cm，底部平坦，深 周围黏膜呈放射状向溃疡集中 龛影位于胃腔轮廓之外	火山口或皿状，边缘隆起不整齐，多＞ 2cm，底部凹凸不平，较胃溃疡浅，坏死出血明显 周围黏膜中断、结节状肥厚 龛影位于胃腔轮廓之内

与大肠癌密切相关的基因（2003、2012）

- **①原癌基因：MYC、RAS、BRAF**
- **②抑癌基因：P53、P16、APC（遗传性腺瘤性息肉病）、DCC、MCC、DPC**
- **③错配修复基因：MLH 和 MSH（遗传性非息肉病性大肠癌 /Lynch 综合征）“非错不可霉死了”**