
乳腺疾病 ★★★ (0~1题)
乳腺导管上皮增生
①普通型：流水样分布“水 - 普通”
②非典型（癌前病变）：分布均匀、单一形态
乳腺癌
①雌激素暴露时间延长，如月经早、绝经晚、晚育不育、肥胖、乳腺增生性病变
②遗传如 BRCA 缺陷
好发于外上象限
缺失肌上皮细胞（与硬化性腺病鉴别，2018）
分类
非浸润癌（2010）
①导管原位癌 / 导管内癌：其中高级别者为粉刺癌（1998、2004、2011、2014、2015）
②小叶原位癌
浸润癌
①浸润癌非特殊型 / 浸润性导管癌（最常见）
②浸润性小叶癌：单行串珠状 / 列兵样或环形排列在导管周围（2009、2014）
特殊型（2008、2013、2015）
小管癌 / 高分化腺癌、大量淋巴细胞浸润的髓样癌、粘液腺癌、分泌性癌、实性乳头状癌“软软的小实性乳头分泌黏液”
比浸润癌非特殊型预后好
炎性乳癌预后最差
临床（2012）
橘皮样变（皮肤水肿）：阻塞淋巴管
酒窝征（皮肤凹陷）：侵犯 Cooper/ 乳房悬韧带
淋巴转移最早最常见：首先至同侧腋窝淋巴结
也易经椎旁静脉转移至骨等
ER+：预后较好，可内分泌治疗
HER2+：预后较差，可靶向治疗