结核（0~2题）★★★

结核结节 / 肉芽肿“凌晨累死”（2006、2010、2022、2024、2025）

- 上皮样 / 类上皮细胞（吞噬结核杆菌的单核 - 巨噬细胞）、朗汉斯巨细胞（Langhans）、淋巴细胞、成纤维细胞
- 干酪样坏死（2013）—— 彻底的凝固性坏死，无结构嗜酸性红染颗粒物

继发性肺结核		
局灶型肺结核（2005、2009、2015）	非活动性	肺尖多见，境界清楚（增生为主）
浸润型肺结核（最常见，2021）	活动性	境界不清的云雾影（渗出为主），可有薄壁空洞
慢性纤维空洞型肺结核（2008）	开放性（传染性强）	厚壁空洞：内层（干酪样坏死物 + 大量结核杆菌）、中层（肉芽组织）、外层（纤维结缔组织） 广泛纤维化、肺门抬高、垂柳影、可并发慢性肺心病
干酪性肺炎（2015、2021）	病情危重	虫蚀样空洞，可有大叶性实变
结核球（2005）	结核瘤	境界清楚的纤维包裹干酪样坏死灶
结核性胸膜炎	湿性、干性	可致胸腔积液、胸膜增厚粘连

	原发性肺结核	继发性肺结核（2001、2003、2014）
结核杆菌感染	初次、无免疫力	再次（内源复发为主）、有免疫力
好发	儿童	成人
病理特征	原发复合征（哑铃影）（1999、2015、2019）—— 肺内原发灶：上叶下部、下叶上部近胸膜处（起始部位） 淋巴管炎 肺门淋巴结结核：肺门淋巴结肿大	病变常从右肺尖开始 上重下轻、上旧下新、较局限 常伴空洞
主要播散途径	淋巴道或血道“TB 嚣张”（2002、2011）	支气管（2002）