其他传染病 ★★★（0~2 题）

血吸虫病

虫卵引起的损害最主要最严重（肉芽肿，1999、2001、2013）
主要沉着于直肠、乙状结肠、肝，Ⅳ型变态反应

急性虫卵结节（2003）	慢性虫卵结节 / 假结核结节
放射状火焰样嗜酸性棒状物（Hoeppli） 嗜酸性脓肿（大量嗜酸性粒细胞，2020） Charcot-Leyden 结晶 虫卵周围的肉芽组织含大量嗜酸性粒细胞 晚期出现类上皮细胞	毛蚴已死亡 类上皮细胞为主 少量异物巨细胞、淋巴细胞、成纤维细胞 “凌晨累异”

性传播疾病

- 梅毒（2000、2015）
  - 基本病变：闭塞性动脉内膜炎、小血管周围炎、肉芽肿（特征）
  - 一期：硬下疳（2007、2014）
  - 二期（传染性最大）：梅毒疹（2014）
  - 三期（传染性最小）
    - 树胶样肿 / 梅毒瘤（肉芽肿）
      - 浆细胞和淋巴细胞多见（浆细胞恒定出现“乌梅子酱”，2016、2018）
      - 类上皮细胞和朗汉斯巨细胞少见
      - 凝固性坏死（可见原有血管壁轮廓，2004）
      - 绝少钙化
    - 主动脉炎、主闭、主动脉瘤、麻痹性痴呆、脊髓痨、马鞍鼻“主主主延毕咯 mlb”
- 尖锐湿疣 —— HPV-6、11 型等，挖空 / 凹空细胞
- 淋病 —— 急性化脓性炎