损伤的修复★☆☆（0~1题）

再生潜能（2005、2006、2008、2009、2025）

- 不稳定 / 持续分裂“三皮 + 造血”
  - ①皮肤表皮细胞
  - ②黏膜被覆上皮细胞（呼吸道 / 消化道 / 生殖道“道”）
  - ③间皮细胞（腹膜 / 胸膜 / 心包膜）
  - ④淋巴造血细胞
- 稳定 / 静止：腺体细胞（肝 / 胰 / 肾小管 / 汗腺）、血管内皮细胞、平滑肌细胞、纤维细胞、神经胶质细胞、骨细胞、软骨细胞
- 永久 / 恒定：神经元 / 神经细胞、心肌细胞、骨骼肌细胞

纤维性修复（纤维化）

- 如慢性炎症
- 肉芽组织（无神经）
  - 结构“新成员”（2005、2009、2012、2016、2019、2022）
    - ①大量新生毛细血管（内皮细胞）：毛细血管袢状弯曲→鲜红色细颗粒状
    - ②大量成纤维细胞 / 纤维母细胞（特征）：有收缩功能为肌成纤维细胞（促进伤口收缩）
    - ③数量不等的炎细胞（巨噬细胞为主 - 它能分泌生长因子。但急性血吸虫虫卵结节周围的肉芽组织以嗜酸性粒细胞为主）
  - 功能（1996、2023）
    - ①修复以填补组织缺损
    - ②抗感染保护创面
    - ③机化或包裹坏死组织、血栓、炎性渗出物、异物
  - 结局：发生玻璃样变性（胶原纤维等细胞外基质增多、而其余成分减少）→瘢痕组织（2019）

经典干扰：肉芽组织 VS 肉芽肿

骨折愈合（2012）

	肉芽组织	骨小梁
血肿形成	×	×
纤维性骨痂	√	×
骨性骨痂（排列紊乱的编织骨）	√	√
骨痂改建或再塑（板层骨）	×	√

影响愈合

- 血供：提供营养利于愈合
- 缺乏含硫氨基酸、VitC、锌→影响细胞外基质（胶原蛋白和弹性蛋白）形成→减弱伤口愈合强度（2009、2013）
- 瘢痕疙瘩 / 蟹足肿与肥大细胞有关

完全修复（1996、2003、2011、2014、2015、2016）

- 肝细胞点状坏死和嗜酸性坏死
- 急性糜烂性胃炎
- Ⅰ度烧伤（表皮浅层）、浅Ⅱ度烧伤
- 骨折、肌腱断裂经功能恢复后