局部血液循环障碍 ★★★（0~3题）

淤血即血液淤积在小静脉、毛细血管内

右心衰致肝淤血 —— 槟榔肝：慢性肝淤血→小叶中央静脉和血窦淤血扩张呈暗红色 + 周边肝细胞脂肪变性呈黄色

左心衰致肺淤血（2006、2007、2008、2009、2010、2013、2016、2017、2021、2024、2026）

	急性	慢性
肺泡毛细血管扩张	√	√
肺泡间隔水肿	√	√
肺泡间隔纤维化	×	√
肺泡腔内伊红色水肿液（含纤维素）	√	√
肺泡腔内漏出的红细胞（肺静脉端毛细血管静水压和通透性增高、破裂）	√	√
肺泡腔内心衰细胞（含有含铁血黄素的巨噬细胞）	×	√
肺褐色硬化	×	√

血栓形成

活体心血管内血液发生凝固或血液中某些有形成分凝集形成固体质块的过程（2000、2001、2009）

①内皮细胞损伤（最常见）：内皮下胶原暴露
②血流缓慢、涡流形成
③血液凝固性增加（恶性肿瘤等）

（1996、1997、1998、2001、2002、2003、2004、2005、2008、2009、2012、2013、2016、2019、2021、2022、2023、2025）

	白色血栓	混合血栓	红色血栓	纤维素性血栓
别称	血小板 / 析出性血栓	层状血栓	阻塞性血栓	透明 / 微血栓
主要出现部位	血流较快的心脏、动脉	心脏、动脉，可呈球状、可为附壁血栓“这一层有混球附着”	下肢深静脉	毛细血管（只能在显微镜下观察）
主要成分	血小板	灰白色血小板小梁和纤维素网（充满红细胞）交替	纤维素网（充满红细胞）	纤维素
栗子	风湿病、SLE 心瓣膜的疣状赘生物 急性非 ST 段抬高心梗冠脉内	二狭的左心房、心梗的左心室 动脉粥样硬化溃疡、动脉瘤	下肢深静脉	弥散性血管内凝血 DIC（如休克、羊水栓塞） 超急性排斥反应
延续性血栓	头部“白刀子进红刀子出”	体部	尾部	-