
局部血液循环障碍 ★★★
（0~3题）
栓塞
循环血液中出现不溶于血液的异常物质随血流运行阻塞血管腔的现象
栓子
（1996、2000、2005、2007、2011、2013、2014、2015、2019、2024）
脱落的血栓（最常见）
长期卧床等下肢深静脉血栓形成后脱落→肺动脉栓塞
亚心炎、二狭、心梗等左心血栓脱落→脑、肠、四肢动脉等体循环栓塞
脂滴
股骨等长骨骨折（多＜3天）、糖尿病等→肺动脉栓塞为主，也可体循环栓塞
气体
正压静脉输液等→空气栓塞
减压病 / 沉箱病 / 潜水员病→氮气栓塞
羊水
分娩→肺栓塞（肺小动脉和毛细血管内有角化上皮、胎毛等）
致猝死：过敏性休克、血管痉挛、DIC
微生物、肿瘤细胞团、绒毛等
梗死（2026）
原因
血栓形成最常见（2010）
梗死灶
形状取决于血管分布方式
地图形：心“心电图”
节段形：肠
锥形：脾、肾、肺（尖端指向门）
质地取决于坏死类型
心、肾、脾：凝固性坏死（2020）
脑：液化性坏死
颜色取决于病灶内含血量
贫血性 / 白色梗死
心、肾、脾、脑“心身疲劳”（2009）
出血性 / 红色梗死（2012、2016、2025）
肠、肺“出场费”
严重淤血（肺梗死先决条件）、组织疏松