
炎症（1~4题）★★★
概述（2026）
对损伤因子（生物性因子最常见）作出的以防御为主的反应（2000）
中心 - 血管反应（2013）
血流动力学改变
血管短暂收缩→血管扩张、血流加速→血流缓慢甚至淤滞
血管通透性增加（2001、2006、2014）
液体和蛋白渗出的主要原因
①内皮细胞收缩及间隙增大：累及细静脉（毛细血管后小静脉）“间隙 - 细”
②内皮细胞穿胞增强：累及细静脉
③内皮细胞损伤（烧伤、化脓菌、白细胞介导）- 速发持续：累及全部微循环（2007、2015）
烧伤主要机制是直接损伤内皮细胞（使内皮细胞变性坏死脱落、基底膜受损）
④新生毛细血管内皮细胞高通透性：累及毛细血管（毛细血管再生包括出芽式和套叠式血管生成）
表现
血管扩张充血→红
C5a、C3a、PG、P 物质、组胺、缓激肽、NO “晚上皮皮煮红鸡蛋”
炎性渗出物→肿
热
PG、IL-1、TNF “PGone 惹老总”（2014）
痛
缓激肽、PG、P 物质“缓解屁屁疼痛”
功能障碍
血 WBC
↑
多数细菌：中性粒细胞（2020）
寄生虫、过敏：嗜酸性粒细胞（2020、2023）
某些病毒：淋巴细胞、单核细胞“林丹”
↓
多数病毒、立克次体、原虫、伤寒杆菌
变质
乙脑、阿米巴、中毒性心肌炎、病毒性肝炎“yi 巴毒心肝”（2014）