肿瘤（1~3题）★★★

肿瘤组织

- 构成（2016）
  - 实质（肿瘤细胞 - 特征）：判断分化方向、进行分类、决定生物学行为
  - 间质（结缔组织 / 成纤维细胞、血管 / 内皮细胞、淋巴细胞、巨噬细胞“凌晨内噬”）：支持和营养实质、参与免疫、构成微环境影响肿瘤生长 / 分化 / 迁移
- 异型性（1998、2001、2007、2009）
  - 与来源的正常组织有差异 —— 细胞异型性、组织结构异型性（空间排列方式不同）
良性肿瘤组织结构异型性比其细胞异型性明显
  - 异型性大→分化低→恶性度高，间变 - 去分化（2013）
  - 异型性对恶性肿瘤分级（如分化程度、核分裂象）：级别越高恶性度越大
- 对比：分期 - 生长范围和播散程度“占地盘”（2005、2018、2020、2022、2024）
  - T：原发灶大小、浸润深度或范围
  - N：淋巴结转移
  - M：远处转移
- 异质性（2012）“亚克隆” —— 单克隆来源的肿瘤细胞形成不同生物学特性的亚群“肿瘤自己不一样”
→恶性肿瘤演进（生长过程中侵袭性增加）

交界性肿瘤：组织形态、生物学行为介于良恶性之间
（浸润生长、多不转移，1999、2000、2003、2023）
如骨巨细胞瘤、带状瘤、侵袭性葡萄胎、卵巢浆液性乳头状囊腺瘤

	良性（1998、2002、2010）	恶性（1996、1999）
一般规律	分化相对好 核分裂象无或少、无病理性核分裂象 多规则、边界较清楚（包膜完整） 出血坏死少见	分化差 核分裂象多、可见病理性核分裂象 多不规则、边界不清（无包膜） 出血坏死等多见
生长	多缓慢、膨胀或外生性、少复发 （但脉管瘤浸润性生长、易复发）	多迅速、浸润性或外生性、多复发 ①肿瘤细胞倍增时间缩短（不是主要因素） ②生长分数高：生长分数高的肿瘤对化疗敏感 ③肿瘤细胞的生成和死亡的比例
转移（2026）	×	√（但皮肤基底细胞癌、卵巢粒层细胞瘤少转移）
分类（2002、2013、2018、2026）		来源上皮→癌：角蛋白 CK、EMA，多形成癌巢 来源间叶→肉瘤：波形蛋白 Vimentin