

肿瘤（1~3题）★★★
恶性肿瘤扩散（最重要生物学特征）
方式（2012、2026）
直接蔓延
淋巴转移（先至边缘窦）
多数癌最早最常见
血道转移
肉瘤最早最常见（如骨肉瘤极易至肺）
癌多在晚期（如胃肠道癌转移至肝）
绒癌、HCC、甲状腺滤泡癌、肺腺癌最早最常见
易经椎旁静脉转移至脊椎骨：乳腺癌、前列腺癌、甲状腺癌、肾癌
种植转移
如 Krukenberg 瘤：尤其胃印戒细胞癌转移至双侧卵巢
步骤（2011）
①癌细胞表面黏附分子 CAM 减少→彼此分离“ca- 咔 - 分开”
②癌细胞层粘连蛋白 LN 受体增加→与基底膜粘着增加“n-nian”
③降解细胞外基质和迁移
促进扩散
演进形成高侵袭性亚群、上皮 - 间质转化 EMT
黏附分子 CD44 高表达“44- 死”、转移抑制基因 nm23 低表达“234”
X 瘤多为良性（1997、2002、2003、2006、2007、2008、2011、2014、2016、2019、2022、2023）
恶性
绿色瘤 / 粒细胞肉瘤、淋巴瘤、骨髓瘤
粒层细胞瘤、无性细胞瘤、卵黄囊瘤 / 内胚窦瘤、胎盘部位滋养细胞肿瘤
Ewing 瘤、弥漫型星形细胞瘤、黑色素瘤、精原细胞瘤、脊索瘤
多数母细胞瘤（除开肌 / 脂肪 / 软骨 / 骨母细胞瘤“鸡汁软骨”）
不是肿瘤
粥瘤、黄色瘤、动脉瘤、室壁瘤、迷离瘤
结核瘤、梅毒瘤、炎性假瘤、创伤性神经纤维瘤