急性肺脓肿 ★☆☆（0~3 题）

吸入性（最常见）

- 厌氧菌等多见
- 右肺多见
  - 仰卧位：上叶后段或下叶背段
  - 坐位：下叶后基底段
  - 右侧卧位：右上叶前段或后段
- 醉酒 / 脑卒中等昏迷、鼻窦炎、牙槽脓肿等误吸病史
  高热、咳大量脓臭痰（之后体温可降低）、可咯血
  X 线早期大片边缘不清的浓密模糊浸润影，之后出现伴液气平的空洞
  可能可能最可能（2007、2014）
- 青霉素（但脆弱拟杆菌用甲硝唑 + 林可霉素类“脆弱的甲壳虫”）
  疗程 6~8 周：空洞周围炎症吸收，空洞缩小消失、最后残留少量纤维条索影（停药，2016）

血源性

- 金葡菌多见（皮肤外伤、疖、痈、骨髓炎、右心心内膜炎等，2021）
- 双肺外野多发空洞及液气囊腔
- 苯唑西林或头孢呋辛

继发性

①金葡菌、克雷伯杆菌、铜绿假单胞菌等肺炎
②支扩、肺癌、肺结核等继发感染
③支气管异物阻塞（尤其小儿）
④邻近病变（如阿米巴肝脓肿累及右肺下叶）