内科含诊断 冠心病 ★★★（1~5 题）

检查

心电图（2007、2019）

- 发作时必做
- 运动负荷试验禁忌症（2015）：ACS、明显心衰、严重心律失常、急性疾病
- 连续动态监测 Holter：胸痛发作时相应时间 ST-T 改变、检出无痛性心肌缺血（隐匿型冠心病）

定性

高耸 T 波：急性心梗超急性期
倒置 T 波伴 ST 段改变：冠心病（2019、2024）
ST 段抬高：变异型心绞痛、STEMI
病理 Q 波：STEMI

定位

Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	下壁 / 膈面
aVR		高侧壁 aVL aVL	aVF	
$V_1V_2V_3$ 前间隔		$V_3V_4V_5$ 局限前壁	$V_5V_6V_7$	前侧壁
V_1—V_5 广泛前壁			V_7—V_8 正后壁	
左前降支			左室前壁、侧壁、心尖、前间隔、二尖瓣前乳头肌	
左回旋支			左室侧壁、左心房	
右冠脉			右室、窦房结、房室结、后间隔、左室下壁	

冠脉造影 DSA（诊断冠心病金标准）、冠脉 CTA（诊断冠心病最常用）（2025）

心肌坏死标志物（2010、2011、2014、2015、2021）

- SMB：2 小时内升高、恢复最早“红枣”，敏感性高、特异性低
- cTn：3~4 小时后升高、恢复最晚（1~2 周），特异性最高（最有价值）
- CK-MB：4 小时内升高，1~2 周内诊断再发心梗、较准确反映梗死范围、高峰＜ 14 小时出现间接判断溶栓再通

核素心肌显像：灌注缺损显示缺血或梗死区域（瘢痕）

超声心动图：室壁运动节段性减弱；诊断急性心梗并发乳头肌功能失调或断裂、室壁瘤、心脏破裂、心梗后综合征