内科含诊断 冠心病 ★★★（1~5题）

- STEMI
  - 心源性休克 — 主动脉内球囊反搏（2020、2024）
  - 心律失常 — 前壁心梗易致室性心律失常、下壁心梗易致房室阻滞和心动过缓
  - 乳头肌功能失调或断裂（2011、2015）
    - 前壁心梗最常见并发症是乳头肌功能失调（抗缺血治疗后多好转） — 二尖瓣脱垂→心尖收缩中晚期喀喇音（额外心音 / 附加音）；二闭→心尖收缩期吹风样杂音
    - 二尖瓣后乳头肌断裂多见于下壁心梗：急性二闭→急性左心衰
  - 室壁瘤 — 左侧心界扩大、超声心动图反常搏动 / 矛盾运动、心电图 ST 段持续抬高
  - 栓塞、猝死
  - 心脏破裂 — ①心室游离壁破裂（主要）：急性心脏压塞→心包穿刺；无脉性电活动
②室间隔破裂：胸骨左缘 3~4 肋间收缩期杂音
  - 急性左心衰
    - 突发喘憋、端坐呼吸、咳粉红色泡沫痰、双肺湿啰音
    - Killip 分级（2007）“1 无 23 啰 4 休克” — Ⅱ级肺啰音＜ 50%；Ⅲ级肺啰音＞ 50%；Ⅳ级心源性休克（收缩压＜ 90、PAWP ≥ 18、CI ≤ 2.2）
  - 心梗后 Dressler 综合征（数周~数月） — 心包炎、胸膜炎、肺炎

（2014、2023）

	发生率	主要表现	主要心律失常	利尿剂和硝酸酯类	补充血容量
左室梗死	常见	可有肺水肿	室性心律失常	√	CVP 和或 PAWP ↓则需要（＞ 18 停止输液）
右室梗死	少见	颈静脉怒张	房室传导阻滞	×	要“水泵变水管”