

舒张性心衰★☆☆
（0~1题）
射血分数保留型心衰 HFpEF（2007）
超声心动图 E/e'≥ 15、E/A ＜ 1.2“大姨姨叫我小幺儿”
搏出量↓，LVEF（搏出量 / 心室舒张末期容积）≥ 50%
可先于收缩性心衰出现；可与收缩性心衰同时出现
心室舒张功能障碍（抽吸↓）
顺应性减退和充盈障碍：高血压早期致心室肌肥厚（最常见）、肥厚型心肌病等
主动舒张功能障碍：冠心病早期→心肌能量↓→ Ca^{2+} 不能及时回收入肌浆网和排出胞外
压力 - 容积环缩小、曲线左上移
（舒张期容积↓、压力↑）
治疗“ABCD”（2007、2012）
禁用强心苷等正性肌力药（没有正性松弛作用）
ACEI/ARB/ARNI：伴高血压、冠心病（降高血压 / 后负荷→减轻肥厚→增加充盈）
β 受体拮抗剂：肥厚型心肌病首选（减少猝死风险）
负性频率→延长舒张期→增加充盈
负性传导→减少室性快速型心律失常（减少晕厥）
负性肌力→减轻左室流出道梗阻
CCB
利尿剂：降肺静脉压 / 前负荷缓解呼吸困难，但避免过量致左室充盈↓