# 内科含诊断 胃炎（含胃酸小结 & Hp 小结）★★☆（0~2 题）

## 急性糜烂出血性胃炎

- NSAIDs、应激、饮酒后急性上腹痛 + 上消化道出血（NSAIDs 抑制 COX-1 →前列腺素↓，2017）
  - 可能可能最可能
- 急诊胃镜：诊断 + 止血

## 慢性胃炎

- Hp 感染（最常见）、十二指肠 - 胃反流、NSAIDs、饮酒、自身免疫等（2012）

### 萎缩性胃炎

- 胃镜：黏膜变薄、皱襞稀疏平坦、黏膜下血管透见、腺体变小和减少
  淋巴细胞和浆细胞浸润（出现中性粒细胞提示活动期）
  腺上皮化生：肠上皮化生、假幽门腺化生
  - 可能可能最可能（2026）

（2007、2018、2019、2020、2022、2026）

| | A 型 / 自身免疫性胃炎（2026） | B 型 / 多灶萎缩性胃炎 |
|---|---|---|
| 发病率 | 低 | 高 |
| 病因 | 自身免疫 | Hp |
| 抗壁细胞和内因子抗体 | + | - |
| 好发部位 | 胃底、胃体 | 胃窦“逗比” |
| 胃酸分泌 | 明显↓（缺乏） | 正常或↓ |
| 血胃泌素 | ↑ | ↓ |
| 贫血 | 巨幼贫（$VitB_{12}$ ↓，MCV ＞ 100）<br>缺铁贫（HCl ↓，MCV ＜ 80） | 无恶性贫血 |
| 伴消化性溃疡 | × | √ |
| 治疗 | 糖皮质激素、注射 $VitB_{12}$ | 根除 Hp |

- 处理癌前情况
  - 在根除 Hp 的前提下，补充维生素、硒
  - 药物不能逆转的局灶重度异型增生和原位癌→胃镜黏膜下剥离术 + 定期随访

### 胃酸小结

- 胃酸明显减少 / 缺乏（MAO=0）：A 型胃炎、胃癌
- 胃酸减少：B 型胃炎伴大量 G 细胞丧失
- 胃酸正常或减少：B 型胃炎、胃溃疡Ⅰ / Ⅳ型
- 胃酸增加：十二指肠溃疡、胃溃疡Ⅱ / Ⅲ型
- 胃酸明显增加：胃泌素瘤

### Hp 小结

- 慢性胃炎、消化性溃疡、胃癌、胃淋巴瘤
  - 大部分急性胃炎、胃食管反流病、A 型慢性萎缩性胃炎与 Hp 无关
- 首选、金标准、复查：非侵入性的尿素呼气试验（2014）
- 快速尿素酶试验：侵入性检查首选（2014）
- Hp 抗原：简单准确
- Hp 抗体：复查不出现假阴性（不能判断根除，2012）
- 四联：PPI+ 铋剂 +2 种抗生素
  （四环素、克拉霉素、喹诺酮类、甲硝唑和替硝唑、阿莫西林、氨苄西林、呋喃唑酮，“四克拉的镯子让花甲之年的阿莫娶到了苄夫人”，2015、2016）
- 疗程 10~14 天；根除 Hp 至少 4 周后复查“2 种抗生素 - 疗程 2 周、四联疗法 -4 周复查”